

PARAGUAY

ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2004

Informe Resumido

ENDSSR 2004

DICIEMBRE 2004



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



IPPF / RHO



**ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA
Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2004
ENDSSR 2004**

INFORME RESUMIDO

Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF)

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) Atlanta, Georgia

Diciembre de 2004 - Asunción, Paraguay

ÍNDICE DE CONTENIDO

	Páginas
PRESENTACIÓN	5
1. INTRODUCCIÓN	7
1.1 Antecedentes y objetivos de la encuesta.....	7
1.2 Organización de la encuesta.....	7
1.3 Temas del cuestionario.....	7
1.4 Aspectos operativos y procesamiento de datos.....	8
2. METODOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTREVISTADAS	9
2.1 Diseño de la muestra.....	9
2.2 Cobertura de la muestra.....	10
2.3 Características de las viviendas.....	10
2.4 Características generales de las mujeres entrevistadas.....	11
3. FECUNDIDAD	13
3.1 Tendencia de la fecundidad.....	13
3.2 Diferenciales de la fecundidad.....	15
3.3 Planeación de los nacimientos.....	16
4. PLANIFICACIÓN FAMILIAR	17
4.1 Conocimiento de métodos anticonceptivos.....	17
4.2 Tendencia de la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos.....	17
4.3 Diferenciales en los niveles de uso.....	18
4.4 Fuente de obtención de métodos anticonceptivos modernos.....	20
4.5 Mujeres que necesitan servicios de planificación familiar.....	20
5. ADOLESCENTES Y ADULTAS JÓVENES	21
5.1 Fecundidad.....	21
5.2 Primera experiencia sexual.....	21
5.3 Uso de anticonceptivos en la primera experiencia sexual.....	23
6. SALUD MATERNA E INFANTIL	24
6.1 Atención prenatal.....	24
6.2 Lugar de atención y tipo de parto.....	25
6.3 Control del recién nacido.....	26
6.4 Inmunización.....	26
6.5 Lactancia Materna.....	27
7. CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE ITS, VIH/ SIDA	28
7.1 Conocimiento de ITS y VIH/ SIDA.....	28
7.2 Formas de prevención del VIH/ SIDA.....	28
7.3 Percepción de riesgo hacia el VIH/ SIDA.....	29
7.4 Actitudes ante el VIH/ SIDA.....	30
8. VIOLENCIA VERBAL, FÍSICA Y SEXUAL	31
8.1 Violencia verbal, física y sexual en mujeres casadas o unidas.....	31
8.2 Violencia sexual en todas las mujeres de 15 a 44 años.....	33
ANEXOS	35
Cuadros	37
Indicadores y Datos Básicos del Paraguay	72

PRESENTACIÓN

El Centro Paraguayo de Estudios de Población, CEPEP, llevó a cabo la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva, ENDSSR 2004, a través de su Departamento de Investigación y Evaluación en cumplimiento a uno de sus objetivos institucionales prioritarios: realizar y difundir investigaciones sobre población y salud sexual y reproductiva que permitan conocer mejor la realidad nacional. Para la realización de la encuesta se visitaron más de 12.000 hogares y se entrevistaron más de 7.000 mujeres de 15 a 44 años.

La encuesta proporciona información actualizada en temas de: fecundidad, planificación familiar, nupcialidad, salud materno-infantil, violencia hacia las mujeres y, por primera vez, conocimientos y actitudes sobre ITS y VIH/ SIDA.

La realización de la ENDSSR 2004, ha sido posible gracias a la cooperación de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, la Federación Internacional de Planificación Familiar, IPPF, y el apoyo técnico de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, de Atlanta, Georgia.

Esta encuesta aporta información valiosa para la implementación y evaluación del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2003-2008. El CEPEP espera que los datos aportados por la ENDSSR 2004 sirvan de base para la toma de decisiones con respecto a temas de población y salud reproductiva, de importancia para nuestro país y al mismo tiempo, que sean de utilidad a los técnicos que elaboran planes y proyectos de desarrollo económico y social orientados a favorecer a la población del Paraguay.

Deseamos manifestar nuestro sincero reconocimiento hacia todas las mujeres que generosamente accedieron a ser encuestadas, proporcionando la valiosa información incluida en este estudio.

Finalmente, debemos resaltar y felicitar el excelente trabajo realizado por el equipo humano que participó en el estudio.



Dra. Cynthia Prieto
Directora Ejecutiva

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes y objetivos de la encuesta

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva, ENDSSR 2004, fue realizada por el Centro Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP), con la cooperación de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) y con la asesoría técnica de la División de Salud Reproductiva de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Georgia. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social designó un Comité Ad-Hoc que revisó el cuestionario utilizado en la encuesta.

La ENDSSR 2004, es la quinta de una serie de encuestas realizadas a nivel nacional por el CEPEP, con el objetivo de mantener una evaluación periódica y actualizar los principales indicadores de fecundidad, planificación familiar, nupcialidad, preferencia sobre el número de hijos, salud materno infantil, acceso a servicios de salud, comportamiento de adolescentes y adultas jóvenes y violencia hacia las mujeres; en esta ocasión, ampliada con relación a encuestas anteriores. Además en esta oportunidad se incluye un módulo de conocimientos y actitudes sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/ SIDA.

Los resultados obtenidos permitirán conocer la realidad actual del país y posibilitarán la comparabilidad con otras encuestas nacionales e internacionales. Esta encuesta es un aporte al Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2003-2008 y se espera que la información sirva para evaluar los programas actualmente existentes y para diseñar nuevas acciones y proyectos dentro del contexto de demografía y de salud sexual y reproductiva.

En este informe se presenta un resumen de los principales hallazgos de la ENDSSR 2004 y se

describe brevemente algunos de los temas más importantes investigados en la encuesta. Los resultados de los indicadores mencionados en el texto se presentan gráficamente. Se omiten los cuadros dentro del cuerpo del informe, los que fueron incluidos en el anexo de este documento.

1.2 Organización de la encuesta

Para los fines de la encuesta se ha excluido la Región Occidental o Chaco, excepto el distrito de Villa Hayes, por su baja densidad poblacional. Se han conformado cuatro regiones dentro de la Región Oriental. Las regiones incluyen los siguientes departamentos:

Región 1: Gran Asunción, que comprende Asunción y los distritos de Fernando de la Mora, Ñemby, San Lorenzo, Luque, Limpio, Lambaré y Villa Hayes.

Región 2: Norte, comprende los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay.

Región 3: Centro Sur, conformada por los departamentos de Cordillera, Paraguari, Guairá, Caazapá, Ñeembucú, Misiones y parte de Central fuera del Gran Asunción.

Región 4: Este, comprende los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú.

1.3 Temas del cuestionario

Para la recolección de datos de la ENDSSR 2004 se utilizaron dos cuestionarios. Un Cuestionario de Hogar y un Cuestionario Individual.

El Cuestionario de Hogar, recopila los siguientes datos:

- a. El número total de personas que residen habitualmente en la vivienda.
- b. El listado de mujeres de 15 a 44 años de edad que viven habitualmente en el hogar, lo que permite la selección aleatoria de una mujer en edad fértil a la que se le aplicó el cuestionario individual.

El Cuestionario Individual, se utilizó para tomar los datos detallados de la mujer en edad fértil (15-44 años de edad) seleccionada de acuerdo al cuestionario de hogar.

El Cuestionario Individual consta de los siguientes capítulos: identificación; características generales de la entrevistada; historia de nacimientos; salud en la niñez; planificación familiar; preferencias reproductivas; adolescentes y adultas jóvenes; actividad sexual y salud reproductiva; nupcialidad; vivienda; conocimientos y actitudes sobre ITS, VIH/ SIDA y violencia verbal, física y sexual hacia las mujeres.

1.4 Aspectos operativos y procesamiento de datos

La encuesta fue diseñada en julio de 2003. Se elaboró el diseño de la muestra, el cuestionario preliminar y luego de la prueba piloto, que se llevó a cabo en febrero de 2004 en área urbana y rural, se confeccionó el cuestionario definitivo.

La convocatoria para contratar al personal que sería capacitado se efectuó en el mes de febrero y la capacitación de posibles supervisoras y entrevistadoras se realizó del 2 al 12 de marzo de 2004, con una duración de dos semanas. Esta capacitación estuvo dirigida a 50 mujeres de las cuales fueron seleccionadas 24 encuestadoras y 8 supervisoras con las que se constituyeron 8 brigadas. Cada brigada estaba conformada por la supervisora, 3 encuestadoras y 1 conductor.

Además fueron conformadas otras dos brigadas de supervisión integrada cada una de ellas por la jefa de campo y funcionarios de investigación del CEPEP.

Para la recopilación de la información de la ENDSSR 2004 se utilizó como marco muestral la Muestra Maestra del CEPEP confeccionada en el año 2001 con un trabajo previo de actualización cartográfica que tuvo lugar entre agosto y octubre de 2003.

Por primera vez, la encuesta se basó en una cartografía georreferenciada producida por el CEPEP en el marco del Proyecto Muestra Maestra realizado con la colaboración de USAID. Cada supervisora contaba con 1 GPS (Sistema de Posición Global Georreferenciada), que contiene los 352 conglomerados de viviendas que fueron visitados, lo cual ayudó a ubicar en menor tiempo y con exactitud la vivienda de arranque dentro del conglomerado.

La recolección de la información se inició el 15 de marzo en Asunción y Área Metropolitana; el 12 de abril en la Región 2, Norte; el 3 de mayo en la Región 3, Centro Sur; el 24 de mayo en la Región 4, Este; y desde el 14 de junio se realizaron revisitas que quedaron pendientes en Asunción y Área Metropolitana. El trabajo de campo concluyó el 11 de julio de 2004. La etapa de codificación y digitación de los cuestionarios se inició el 16 de marzo y se prolongó hasta el 14 de agosto de 2004.

Durante la misma fase de recolección de datos se integraron dos equipos de trabajo de cuatro digitadores/ as cada uno, en dos turnos de 4 horas, quienes introdujeron la información, utilizando el programa CS Pro 2.4, con un uso extenso de una serie de algoritmos para evaluar la consistencia entre las respuestas registradas, así como las omisiones voluntarias o involuntarias. La supervisión del programa informático estuvo a cargo de 2 personas. De esta forma, se minimizaron los errores de digitación y de las entrevistadoras.

El apoyo logístico estuvo a cargo del Departamento de Administración y Finanzas del CEPEP, por medio de sus oficinas de tesorería, suministros y contabilidad. Más de 90 personas participaron en la realización de esta encuesta.

2. METODOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTREVISTADAS

2.1 Diseño de la muestra

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva del Paraguay, **ENDSSR 2004**, fue implementada en la Región Oriental del país, excluyendo la Región Occidental (más conocida como el Chaco), debido a la baja densidad y a su alto grado de dispersión poblacional. Cerca del 98 por ciento de la población está concentrado en la Región Oriental. La muestra fue diseñada para producir aproximadamente 7.000 entrevistas completas de mujeres en edad fértil (15 a 44 años de edad). Es de tipo probabilístico, autorrepresentada a nivel de cuatro regiones: Asunción y Área Metropolitana, Norte, Centro Sur y Este. Este diseño permite obtener también estimaciones representativas de las zonas urbana y rural a nivel del país.

El esquema de muestreo estadístico utilizado consiste en un diseño probabilístico en tres etapas y de conglomerados. Probabilístico porque todas las mujeres que conforman el universo tienen una probabilidad conocida, diferente de cero, de ser seleccionadas. La unidad primaria de muestreo (UPM) es el sector censal, la unidad secundaria de muestreo (USM) es la vivienda y la unidad de muestreo de la tercera etapa es la mujer en edad fértil (MEF).

La selección de sectores censales (UPM), se realizó en forma sistemática, con arranque aleatorio, con base en probabilidades proporcionales a su tamaño (PPT), medidas por el número de viviendas particulares existentes de acuerdo con la información de la muestra maestra del CEPEP diseñada en el año 2001 con base en datos del Censo 1992 y posteriormente ajustada con datos del Censo 2002.

La selección fue independiente para cada región; de esta manera, la probabilidad de selección de las UPM es diferente para cada dominio de la muestra. Por lo tanto, se aplica un factor de ponderación para cada dominio, el factor es proporcional al inverso de la probabilidad de selección de una vivienda en el dominio.

Los factores de ponderación para cada dominio (región) son los siguientes: La región Norte tiene una ponderación menor a 1.0 (0.462), reflejando sobre muestreo en esta región, para permitir estimaciones con la misma precisión que las otras regiones. En las otras, los factores de ponderación son ligeramente superiores a 1.0, así se tiene: Gran Asunción: 1.200; Centro Sur: 1.151 y Este: 1.215.

La segunda etapa de selección consistió en escoger un número fijo de viviendas dentro de cada sector de la muestra, esto se hizo en forma aleatoria con el fin de asegurar que todas las viviendas por sector tuvieran igual probabilidad de ser seleccionadas. Para esta etapa, se utilizaron los listados de viviendas producto de la actualización cartográfica. Se procedió a seleccionar aleatoriamente una vivienda de partida entre el número l y la n ; siendo n el número total de viviendas del sector. Las viviendas incluidas en la muestra son las de inicio y las $n-l$ consecutivas.

Para la tercera etapa de selección, se incluyó en un listado de la vivienda a todas las mujeres en edad fértil (MEF), de 15 a 44 años de edad, iniciando con la de mayor edad y prosiguiendo en forma descendente.

Luego se seleccionó en forma aleatoria solamente una MEF por vivienda, utilizando en el cuestionario de hogar un cuadro que permite tal selección de acuerdo al último dígito del cuestionario y al número de MEF en la vivienda.

La probabilidad de selección de cada entrevistada era inversamente proporcional al número de mujeres de 15 a 44 años en la vivienda. Por tanto se aplica como factor de ponderación el número de MEF en la vivienda para compensar esta desigual probabilidad de selección.

Para mujeres con hijos nacidos vivos que los tuvieron entre enero de 1999 hasta febrero de 2004, se seleccionó aleatoriamente un hijo, para

aplicar preguntas adicionales sobre parto, control posparto y control del recién nacido.

Para el análisis de estos temas se aplican factores de ponderación, con la misma metodología de compensar la probabilidad desigual de selección de los niños.

En el anexo de este informe se incluyen los cuadros con los resultados de las principales variables, se muestran los porcentajes basados en números ponderados y los números absolutos se refieren a número de casos no ponderados. Algunos cuadros pueden no sumar 100 por ciento debido al redondeo.



2.2 Cobertura de la muestra

Un total de 12.236 viviendas fueron seleccionadas, de las cuales 10.792 estaban ocupadas. Incluyendo las viviendas desocupadas, se completaron cuestionarios de hogares en 12.163 viviendas (99.4 por ciento de las viviendas). Un total de 7.519 mujeres elegibles fueron identificadas a través del cuestionario de hogar, lográndose completar el cuestionario individual para 7.321 de ellas (97.4 por ciento). Menos de 1 por ciento de las mujeres elegibles rechazó la entrevista, mientras que 1.2 por ciento no fue posible entrevistar por estar ausentes del hogar. La tasa total de entrevista varió de 96.1 por ciento en Gran Asunción hasta 97.1 por ciento en la región Centro Sur (Cuadro 1, Gráfico 2.1).

2.3 Características de las viviendas

La encuesta proporciona información sobre el acceso a servicios básicos como agua, electricidad y servicio sanitario en la vivienda, disponibilidad de electrodomésticos, medios de locomoción y comunicación.

El 95.9 por ciento de las entrevistadas reportó que su vivienda cuenta con energía eléctrica. El 68.9 por ciento de las viviendas dispone de conexiones intradomiciliarias como principal fuente de abastecimiento de agua para uso doméstico. En cuanto a la disponibilidad de servicio sanitario, 67.6 por ciento de las viviendas tiene baño



moderno, conectado a la red pública o a un pozo ciego. La diferencia es de casi tres veces a favor del área urbana (87.1 por ciento) respecto al área rural (31.6 por ciento), (Cuadro 2, Gráfico 2.2).

2.4 Características generales de las mujeres entrevistadas


La distribución de las mujeres en edad fértil, MEF, según estado marital indica que 38.9 por ciento son solteras y que alrededor de 54 por ciento están casadas o unidas (32.5 por ciento casadas y 21.2 por ciento unidas). La información sobre la proporción de mujeres casadas o unidas es muy similar entre el Censo de 2002 y la Encuesta de 2004 ya que llega en ambos estudios al 54 por ciento (Gráfico 2.3).

Una de cada 2 mujeres entrevistadas está casada o unida. Proporción similar al resultado del Censo 2002.

Se puede observar un mejoramiento en el nivel de educación de las mujeres en edad fértil en los últimos años al comparar los datos de la ENSMI 98 y la ENDSSR 2004 (Gráfico 2.4). Las que están dentro del grupo de analfabetas funcionales, con un máximo de dos años de estudios han disminuido de 7.5 por ciento a 3.9 por ciento y las que tienen de 3 a 5 años de educación se reducen de 22.1 por ciento a 12.6 por ciento. Por el contrario, las que completaron la secundaria o tienen nivel superior (12 y más años de estudios) aumentan de 21.3 en 1998 a 32.5 por ciento en 2004 (Cuadro 3).


En cuanto a diferencias regionales, las mujeres en el Gran Asunción muestran un nivel de escolaridad más alto que las de otras regiones. En el Gráfico 2.5 se aprecia que las que han completado el nivel secundario o tienen más de 12 años de estudios representan el 46.2 por ciento en el Gran Asunción, en comparación con alrededor de 28 por ciento en las regiones Centro

Gráfico 2.3
Distribución del total país de mujeres de 15 a 44 años de edad entrevistadas, según estado civil y casadas/unidas del Censo 2002.




Fuente: Cuadros 3 y 5

Gráfico 2.4
Distribución porcentual de mujeres de 15 a 44 años de edad, según años aprobados de estudio, por encuestas, ENSMI 1998 y ENDSSR 2004.



Fuente: ENSMI 1998, Cuadro 3.5 y ENDSSR 2004, Cuadro 3


Gráfico 2.5
Porcentaje de mujeres de 15 a 44 años de edad que tienen 12 y más años aprobados de estudio, por región, ENDSSR 2004.



Fuente: Cuadro 4

Sur y Este y tan solo 18 por ciento en la región Norte.

En Paraguay, 1 de cada 3 mujeres de 15 a 44 años trabaja fuera del hogar. Solamente el 23.6 por ciento de las mujeres en edad fértil tienen un seguro de salud, de las cuales 12.9 por ciento está asegurada en el Instituto de Previsión Social (IPS). En el área rural las mujeres aseguradas al IPS apenas llegan a 7.3 por ciento frente a 15.8 por ciento en el área urbana. En el Gran Asunción esta proporción sube a 17.9 por ciento (Gráfico 2.6).



3. FECUNDIDAD


Las estimaciones de fecundidad se basan en las historias de nacimientos tenidos por las mujeres de 15 a 44 años entrevistadas en la ENDSSR 2004. Para cada mujer entrevistada se obtuvieron datos sobre número de hijos nacidos vivos, fecha de nacimiento, sexo de cada hijo y condición de sobrevivencia a la fecha de la encuesta. Esta información permite obtener estimaciones de los niveles y tendencias de la fecundidad.

3.1 Tendencia de la fecundidad

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) es un indicador sintético de los niveles de fecundidad que permite comparaciones entre diferentes períodos y entre diferentes países. Este indicador combina las Tasas Específicas de Fecundidad (TEF) para todos los grupos de edad para el período seleccionado y puede ser interpretada como el promedio de hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda su vida reproductiva, si las TEF por edad obtenidas en el período de estudio se mantuvieran invariables en el tiempo.

La TGF a nivel nacional para el período 2001-2004 para las mujeres de 15 a 44 años es de 2.9 hijos por mujer (Gráfico 3.1 y Cuadro 6, panel A). De acuerdo a diferentes encuestas llevadas a cabo en el país desde el año 1990, se puede ver que después de casi 10 años de lento descenso de la fecundidad (1990-1998), el Paraguay experimentó una disminución importante de la TGF entre los años 1998 a 2004. Esta disminución es paralela con aumentos significativos en la educación de las mujeres paraguayas y con el aumento en la tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos (ver capítulo 4).

Para estudiar con más detalle los cambios ocurridos desde 1998, las estimaciones de la fecundidad fueron calculadas usando los datos de la ENDSSR 2004 para tres períodos de tres años cada uno (95-98; 98-01; 01-04) referidos a 36 meses (de marzo a febrero).



Desde el período 95-98 hasta el 01-04, las mujeres paraguayas disminuyeron su fecundidad en 1 hijo en promedio, pasando de 3.9 a 2.9 hijos por mujer.

Considerando los resultados de la encuesta actual, se observa un descenso constante en la TGF que en conjunto representa una disminución de 1 hijo (25%), 3.9 vs 2.9 hijos por mujer, entre 95-98 y 01-04, con una reducción de 0.5 hijos en cada uno de los períodos de tres años. La diferencia de la TGF (4.3) encontrada en la ENSMI 98 y la TGF (3.9) calculada para el mismo período de tres años usando los datos de la ENDSSR 2004 se debe, probablemente, a la variación de la muestra (mayor número de mujeres encuestadas en 2004).


Mientras que la TGF se redujo en 22 por ciento en áreas urbanas, la reducción en áreas rurales fue de 34 por ciento.

Las tasas específicas de fecundidad en todas las edades muestran consistencia en las estimaciones provenientes de los datos de ambas encuestas (Gráfico 3.2). En el grupo de 20-29 años se nota un descenso continuo desde el período 1995-1998 a 2001-04 en la tasa específica de fecundidad que también afecta fuertemente la TGF porque la mayoría de los nacimientos ocurren en este grupo de edad. La fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años de edad experimentó una reducción de 26 por ciento ya que era de 90 nacimientos por 1000 mujeres en el período comprendido entre 1995-1998 descendiendo hasta 67 nacimientos por 1000 mujeres durante el período 1998-2001, estabilizándose entre el período 1998-2001 y 2001-2004.

Existen diferencias importantes según área de residencia, en todas las encuestas realizadas entre 1990 y 1998 (Cuadro 6, panel B). En las tres encuestas (ENDS 90, ENDSR 1995/6 y ENSMI 1998), las mujeres que residen en zonas rurales tienen en promedio 2.4 hijos más que las del área urbana. Sin embargo, en la encuesta de 2004, esta diferencia se ha reducido a 1.2 hijos: 2.5 hijos en el área urbana y 3.7 en el área rural.


En la región Norte se registra la tasa de fecundidad más alta con un promedio de 3.9 hijos por mujer, siendo Gran Asunción la región con menor fecundidad, 2.4 hijos por mujer. (Gráfico 3.3).

Gráfico 3.2
Tendencia de las Tasas Específicas de Fecundidad, por edad, según varios períodos. Mujeres de 15 a 44 años de edad, ENDSSR 2004.



Fuente: Cuadro 6

Gráfico 3.3
Tasa Global de Fecundidad, por región, ENDSSR 2004.



Fuente: Cuadro 6B



3.2 Diferenciales de la fecundidad

Se observan diferencias en las tasas específicas de fecundidad por edad (Cuadro 7) y en la TGF según residencia, nivel de educación alcanzado e idioma habitualmente hablado en el hogar (Gráfico 3.4). Anteriormente se mencionó que las mujeres rurales tienen en promedio 1.2 hijos más que las residentes en áreas urbanas, estas diferencias son consistentes en todos los grupos de edades.

Es evidente que el nivel educativo de la mujer influye de forma determinante en la fecundidad, las diferencias de fecundidad son mayores cuando se compara la TGF en mujeres con educación mínima que tienen entre 0-5 años de estudios, con mujeres que completaron el ciclo secundario o tienen educación superior. Las del primer grupo, tienen 2 hijos más respecto a las más educadas. También la TGF para mujeres que hablan solamente guaraní en la casa es 1.6 hijos más que las que hablan solamente español (3.9 vs 2.3).

Las mujeres de 0 a 5 años de estudios tienen 2 hijos más que las mujeres que completaron 12 y más años de educación.


Paraguay era uno de los pocos países de Sudamérica que mantenía una alta tasa de fecundidad. En el Gráfico 3.5, se compara la TGF de Paraguay con la fecundidad de otros países que han tenido encuestas similares en años recientes. La TGF de Paraguay es más baja que la de Ecuador y Bolivia ya que se tiene en promedio 2.9 hijos por mujer y dichos países se ubican por encima de este nivel. Mientras que Brasil y Colombia tienen alrededor de 2.5 hijos por mujer.



3.3 Planeación de los nacimientos


Para el análisis de la planeación de los nacimientos se incluye a todas las mujeres que informaron haber tenido por lo menos un nacido vivo en el período comprendido entre marzo de 1999 a febrero de 2004. Para cada nacimiento, se les preguntó, si habían querido quedar embarazadas en ese momento, si querían esperar más tiempo, o si ya no querían más hijos.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, se puede afirmar que en el Paraguay el 72.1 por ciento de los nacimientos ocurridos en el período mencionado fueron embarazos deseados en ese momento. El 28 por ciento de los nacimientos ocurridos en los últimos 5 años no fueron deseados en el momento de su concepción, de ellos el 9.2 por ciento corresponde a nacimientos cuyas madres no querían más hijos y 18.7 por ciento a aquellos que querían, pero más tarde (Gráfico 3.6).



En 7 de cada 10 nacimientos ocurridos, las madres paraguayas planean el embarazo y en 3 de cada 10 preferirían esperar más tiempo o no tener más hijos.

La intención de limitar definitivamente el número de hijos vivos tenidos, aumenta en forma directa con el número de nacimientos. En el Gráfico 3.7 vemos que a medida que es mayor el número de hijos tenidos, aumenta el deseo de no tener más hijos, alcanzando a 21.5 por ciento entre las mujeres con 6 y más hijos tenidos.



4. PLANIFICACIÓN FAMILIAR

En el presente capítulo se analizan los niveles de conocimiento y el uso actual de métodos anticonceptivos de acuerdo a características sociodemográficas de las mujeres en edad fértil casadas o unidas. También se compara la prevalencia de uso anticonceptivo con resultados de encuestas anteriores y de algunos países de América del Sur. Se presenta la fuente de obtención de métodos modernos y la necesidad de servicios de planificación familiar.

4.1 Conocimiento de métodos anticonceptivos


En Paraguay, el conocimiento de métodos anticonceptivos es muy amplio entre las mujeres de 15 a 44 años, independientemente de su estado civil. Siendo los métodos más mencionados el condón (99.4 por ciento), seguido de la píldora (98.1 por ciento), la inyección (97 por ciento), la esterilización femenina (91.5 por ciento) y el DIU (90.2 por ciento) (Gráfico 4.1).

4.2 Tendencia de la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos

La prevalencia en el uso actual de métodos anticonceptivos entre las mujeres casadas o unidas de 15 a 44 años de edad es de 72.8 por ciento, esto representa un aumento de más del 90 por ciento en 17 años. En efecto, ascendió de 37.6 en 1987 a 50.7 por ciento en 1995, llegando al nivel actual (72.8 por ciento), cifra que resulta ser alrededor de 25 por ciento superior a la encontrada en 1998 (Gráfico 4.2).


Actualmente, más de 7 de cada 10 mujeres casadas o unidas usan métodos anticonceptivos.

Gráfico 4.1
Conocimiento de métodos anticonceptivos.
Mujeres de 15 a 44 años de edad,
ENDSSR 2004.



Fuente: Cuadro 10

Gráfico 4.2
Tendencia de la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
en mujeres casadas/unidas de 15 a 44
años de edad. Diferentes encuestas.



Fuente: Cuadro 11

Entre las mujeres casadas o unidas, el incremento en el uso de métodos anticonceptivos obedece principalmente al uso de métodos modernos (Gráfico 4.3), el uso del condón, la esterilización femenina y la inyección presentan aumentos importantes entre 1998 y 2004. La pastilla sigue siendo el método de mayor uso (15 por ciento) (Cuadro 12).

A nivel nacional, la proporción de mujeres casadas o unidas que usan métodos modernos asciende al 60.5 por ciento, lo que representa un 27 por ciento de incremento desde 1998 cuando la proporción era de 47.7 por ciento (Gráfico 4.3).

El 60 por ciento de las mujeres en unión usan actualmente un método anticonceptivo moderno.


A nivel regional, el uso de anticonceptivos alcanzado por Paraguay en el 2004 es muy similar al nivel de Colombia en el 2000, pero es 4 puntos porcentuales menor a Brasil (76.4 por ciento, año 1996). Comparado con Bolivia, es superior en 25 puntos porcentuales (Gráfico 4.4).

4.3 Diferenciales en los niveles de uso

Como se ha mencionado anteriormente, en la actualidad 7 de cada 10 mujeres casadas o unidas usan métodos anticonceptivos. Pero la prevalencia de uso varía dependiendo de algunas características de las mujeres como lugar de residencia, nivel educativo y número de hijos tenidos vivos.


Existe una diferencia de 9 puntos porcentuales en el uso de métodos anticonceptivos entre el área urbana (76.5 por ciento) y el área rural (67.4 por ciento). Cuando se hace referencia a métodos modernos la diferencia también es de 9 puntos porcentuales: área urbana 64.2 por ciento y área rural 55.1 por ciento (Cuadro 14).

Gráfico 4.3
Mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad, según uso actual de métodos, por encuestas, ENSMI 1998 y ENDSSR 2004.



Fuente: Cuadro 12

Gráfico 4.4
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en países seleccionados de Sudamérica. Mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad.



Fuente: Cuadro 13

Por región de residencia, Centro Sur es la que tiene la tasa de uso más alta (76.2 por ciento), seguida de Gran Asunción (74.5 por ciento) y Este (72.8 por ciento). La región Norte, sigue con la prevalencia de uso más baja en el país, 61.3 por ciento, que equivale a por lo menos 10 puntos porcentuales por debajo de las otras regiones (Gráfico 4.5).


En el Gráfico 4.6 se puede apreciar que el uso de métodos anticonceptivos aumenta con el nivel educativo, cuantos más años de estudios tienen las mujeres casadas y unidas, mayor es el porcentaje de uso. La proporción de uso se incrementa de 61.1 por ciento para las mujeres sin educación o con dos años aprobados, hasta 80.1 por ciento para aquellas que alcanzaron el nivel secundario completo o superior.

Se observa una asociación directa entre el aumento de años de estudios y el uso de métodos anticonceptivos.

Con relación al número de hijos vivos y la práctica anticonceptiva, en el Paraguay, una de cada dos mujeres casadas o unidas inicia el uso de métodos sin tener hijos, con la intención de posponer para más adelante la llegada del primer hijo. Las mujeres con tres y cuatro hijos son las que usan en mayor proporción los anticonceptivos (80.9 y 78.3 por ciento, respectivamente) (Cuadro 15).

Una de cada 2 mujeres paraguayas casadas o unidas de 15 a 44 años usa anticonceptivos para postergar la llegada del primer hijo.


Gráfico 4.5
Uso de métodos anticonceptivos, por región, ENDSSR 2004.



Fuente: Cuadro 11

Gráfico 4.6

Uso actual de métodos anticonceptivos en mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad, según años aprobados de estudio, ENDSSR 2004.




Fuente: Cuadro 15

4.4 Fuente de obtención de métodos anticonceptivos modernos

La farmacia continúa siendo la principal fuente donde las mujeres casadas o unidas obtienen los anticonceptivos (49.7 por ciento). En segundo lugar se encuentra el sector público (31.7 por ciento) que incluye el Ministerio de Salud, el Instituto de Previsión Social, la Cruz Roja, la Sanidad Militar y Policial y el Hospital de Clínicas. El Ministerio cubre el 26.9 por ciento de la demanda por métodos anticonceptivos. El sector privado representa el 11.6 por ciento (Gráfico 4.7).

Existen dos fuentes principales de suministro de anticonceptivos: las farmacias y el Ministerio de Salud Pública.




4.5 Mujeres que necesitan servicios de planificación familiar

Se considera mujeres que necesitan servicios de planificación familiar, todas las entrevistadas, independientemente de su estado civil, que son fértiles y sexualmente activas, no están embarazadas ni desean un embarazo y no están usando un método anticonceptivo moderno.

Según los resultados encontrados, el 17.9 por ciento de las mujeres de 15 a 44 años de edad necesita servicios de planificación familiar (Cuadro 17).

La proporción de no usuarias que necesita métodos modernos resultó ser especialmente alta en la región Norte (22.9 por ciento) respecto a las otras regiones (Gráfico 4.8).

Una de cada 6 mujeres no cubierta con servicios de planificación familiar esta expuesta a un embarazo no deseado.



5. ADOLESCENTES Y ADULTAS JÓVENES

En la ENDSSR 2004 se obtuvo información sobre el comportamiento reproductivo de mujeres adolescentes y jóvenes. Al igual que en las Encuestas de 1987, 1995 y 1998 se aplicó un módulo especial a mujeres entre 15 y 24 años de edad. De esta manera Paraguay cuenta con la más larga serie de datos sobre adolescentes y jóvenes en América Latina. Se presentan resultados sobre embarazos, primera relación sexual y uso de anticonceptivos.



5.1 Fecundidad

Las mujeres paraguayas inician su etapa reproductiva a temprana edad. Una de cada cuatro (27.9 por ciento) adolescentes (15-19 años) y adultas jóvenes (20-24 años) en conjunto, declaró haber tenido un embarazo o más. Este porcentaje asciende con la edad pasando de 10.9 por ciento entre las de 15 a 19 años a 46.5 por ciento entre las de 20 a 24 años. También, la proporción de mujeres jóvenes de 15 a 24 años con un embarazo o más en el área rural (33.8 por ciento) es mayor que en las que residen en el área urbana (24.9 por ciento) (Gráfico 5.1).

En el capítulo 3 se ha visto que el número de nacimientos tenidos por las adolescentes descendió en los últimos años. De igual manera, se encontró una diferencia significativa en la reducción del porcentaje de adolescentes y adultas jóvenes que reportaron haber tenido un embarazo o más, disminuyendo de 36.3 por ciento en la ENSMI-98 a 27.9 por ciento en la ENDSSR 2004.

5.2 Primera experiencia sexual

Más de la mitad (57.4 por ciento) de las adolescentes y adultas jóvenes han tenido relaciones sexuales. Para la mayoría de las mujeres estas relaciones fueron premaritales (53.5 por ciento). Tanto en el área urbana como rural la proporción de jóvenes con experiencia sexual sobrepasa el 50 por ciento (Gráfico 5.2).



El porcentaje que tuvo experiencia sexual premarital es más alto entre las que residen en el área urbana (57.6 por ciento) que entre las del área rural (45.3 por ciento).

La proporción de mujeres con experiencia sexual aumenta con la edad, de 35.8 por ciento en el grupo de 15 a 19 años hasta 81.3 por ciento en el grupo de 20 a 24 años (Gráfico 5.2).

De cada 100 adolescentes de 15 a 19 años, 36 han tenido relaciones sexuales y de ellas, 34 han tenido relaciones premaritales.


La proporción con experiencia sexual premarital asciende de 21.3 por ciento entre las mujeres de 15 a 17 años hasta alcanzar 83.3 por ciento en el grupo de 23 a 24 años. Se observa un claro predominio de las relaciones premaritales frente a las maritales para todas las edades (Gráfico 5.3).

Comparando la experiencia sexual premarital de las mujeres de 15 a 24 años según las distintas encuestas de 1987, 1995/6, 1998 y 2004, se encontró que el porcentaje de mujeres con experiencia sexual premarital ha tenido un aumento significativo para el total del país, pasando de 35.1 por ciento en 1987 a 53.5 por ciento en 2004. En la Encuesta de 1998 se observa una disminución pero no es estadísticamente significativa (Gráfico 5.4).

Una de cada 3 mujeres que reportó experiencia sexual premarital tuvo su primera relación antes de cumplir 16 años.

Gráfico 5.3


Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años de edad que han tenido relaciones sexuales, según si lo hicieron premarital o maritalmente, ENDSSR 2004.



Fuente: Cuadro 19

Gráfico 5.4


Porcentaje total de mujeres de 15 a 24 años de edad que han tenido relación sexual premarital, según diferentes encuestas.



Fuente: Cuadro 20

Gráfico 5.5

Tendencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 24 años de edad en su primera relación sexual, según diferentes encuestas.



Fuente: Cuadro 23

5.3 Uso de anticonceptivos en la primera experiencia sexual



Del total de mujeres con experiencia sexual el 56.3 por ciento usó anticonceptivos en su primera relación sexual. Esta proporción ha ido aumentando en los últimos años pasando de 12.2 por ciento en 1987 a 23.6 por ciento en 1995 y a 31.3 por ciento en 1998 (Gráfico 5.5).

El porcentaje de mujeres que usó anticonceptivos en su primera relación marital aumentó de 21.6 por ciento en 1998 hasta 39.5 por ciento en el 2004. El uso de anticonceptivos en la primera relación sexual premarital tuvo un aumento significativo de 33.2 por ciento en 1998 a 57.6 por ciento en 2004 (Gráfico 5.6).

El uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual premarital es mayor en Gran Asunción (62.6 por ciento) y la región Este (60.9 por ciento), mientras que es menor en Centro Sur (53.1 por ciento) y en la región Norte (39.9 por ciento) (Gráfico 5.7).

Las mujeres del área urbana (61.6 por ciento) usan en mayor proporción métodos anticonceptivos en su primera experiencia sexual premarital en relación a las que residen en área rural (47.3 por ciento) (Cuadro 22).

El uso de métodos anticonceptivos en la primera relación premarital está directamente relacionado con los años de estudios. Las mujeres con 12 y más años de estudios en mayor proporción (66.6 por ciento) usan anticonceptivos en su primera relación premarital, frente a las mujeres sin ninguna educación o con apenas cinco grados aprobados (38.4 por ciento) (Cuadro 22).



6. SALUD MATERNA E INFANTIL

En el presente capítulo se abordan los principales temas relacionados con la salud de la madre y el niño, como atención prenatal, lugar de atención y tipo de parto. Control del recién nacido, inmunización y lactancia materna.


6.1 Atención prenatal

Los datos se refieren al uso de servicios durante el embarazo, parto y posparto para los hijos/ as nacidos/ as vivos/ as entre marzo de 1999 a febrero de 2004. En 94.2 por ciento de los nacimientos, sus madres concurren al control prenatal por lo menos una vez y el 68.6 lo tuvo durante el primer trimestre (Gráfico 6.1). Teniendo en cuenta que en la ENSMI 98, el 88 por ciento tuvo al menos un control prenatal, se logró un incremento de 6 puntos porcentuales en los últimos seis años.

En 7 de cada 10 embarazos se cumple con la norma establecida por el MSP y BS, de tener el primer control prenatal en los tres primeros meses de embarazo.


A nivel regional se destacaron diferencias, teniendo la región Centro Sur el mayor porcentaje de consulta prenatal (97 por ciento) y la región Norte el menor porcentaje (89.9 por ciento). Si bien un elevado porcentaje de mujeres afirmó haber consultado durante su último embarazo, el 71.3 por ciento de ellas tuvo 5 controles o más. En la región Norte, solo el 48.5 por ciento de las mujeres hicieron 5 o más consultas prenatales y en la región Gran Asunción este porcentaje se elevó a 85.1 por ciento (Gráfico 6.2).

Gráfico 6.1
Porcentaje de nacimientos vivos de marzo 1999 a febrero 2004 con atención prenatal y trimestre del primer control, ENDSSR 2004.



Fuente: Cuadro 24

Gráfico 6.2
Porcentaje de atención de 5 y más controles prenatales para nacimientos ocurridos en el período marzo 1999 a febrero 2004, por región, ENDSSR 2004.



Fuente: Cuadro 24

6.2 Lugar de atención y tipo de parto

El porcentaje de partos realizados en instituciones es aún bajo en Paraguay aunque se ha demostrado un incremento, pasando de 56.3 por ciento en 1998 a 74.1 por ciento en 2004. (Gráfico 6.3).


A nivel de regiones se pueden observar diferencias en el porcentaje de partos institucionales que van desde 92 por ciento en Gran Asunción hasta 60 por ciento en la región Norte. (Cuadro 25).

Los partos fueron realizados en un 45.1 por ciento en servicios del Ministerio de Salud, en un 16 por ciento en sanatorios o clínicas privadas, en un 7 por ciento en el IPS y en 5.9 por ciento en otras instituciones como la Cruz Roja o la Sanidad Militar o Policial (Gráfico 6.4).

En los partos domiciliarios se encontró que 3.1 por ciento ha sido atendido por partera profesional de la salud, como la licenciada en obstetricia, obstetra técnica o auxiliar. Sin embargo, se debe notar que la mayoría de los partos domiciliarios han sido atendidos por una partera empírica y en algunos casos por parientes. En total el 15.8 por ciento de los partos han sido atendidos por empíricas, llegando este porcentaje en la región Norte a 27.7 por ciento (Cuadro 25).


Uno de cada 5 partos se produce en el domicilio y la mayoría de ellos son atendidos por parteras empíricas.

Gráfico 6.3
Lugar de atención del parto, según encuestas ENSMI 1998 y ENDSSR 2004.



Fuente: ENSMI 1998, Cuadro 8.4 y ENDSSR 2004, Cuadro 25

Gráfico 6.4
Lugar de atención de partos institucionales, ENDSSR 2004.



(*) Cruz Roja, Hosp. Materno Infantil, Hosp. Militar o Policial, Hosp. Clínicas/Maternidad Nacional

Fuente: Cuadro 25

En cuanto al tipo de parto, el 73 por ciento fueron partos vaginales y el 26.9 por ciento cesáreas.

Con relación a los datos de la anterior encuesta se observa un aumento de las cesáreas, de 16.5 por ciento en la ENSMI 98 a 26.9 por ciento en la ENDSSR 2004 (Gráfico 6.5).

6.3 Control del recién nacido



El control médico del recién nacido ha tenido un aumento en la ENDSSR 2004 llegando a 90.1 por ciento en todo el país, siendo mayor en el área urbana (95.3 por ciento) que en el área rural (83.8 por ciento). En la ENSMI 98 la prevalencia del control del recién nacido era de 79 por ciento en todo el país; 93.1 por ciento en el área urbana y 69.9 por ciento en la zona rural (Gráfico 6.6).

Nueve de cada 10 niños/as nacidos/as vivos/as fueron llevados al control médico del recién nacido.

6.4 Inmunización

La cobertura de la inmunización a nivel nacional ha aumentado en la ENDSSR 2004. Los niños de 12 a 23 meses han sido vacunados, conforme a referencia de sus madres o a registro en carné de vacunación, en un 65.2 por ciento con las cuatro vacunas en conjunto (BCG, Polio, DPT y sarampión). La cobertura es similar en el área urbana (65.8 por ciento) y en el área rural (64.4 por ciento) (Gráfico 6.7).

En la ENDSSR 1995/6 la cobertura de las cuatro vacunas a niños de 12 a 23 meses solo alcanzó a 49.8 por ciento para el total del país, siendo mayor en el área urbana (59.4 por ciento) que en el área rural (42.8 por ciento).




En el país, 2 de cada 3 niños de 12 a 23 meses han recibido las cuatro vacunas básicas para cumplir el esquema completo de vacunación: BCG, Polio, DPT y Sarampión.

6.5 Lactancia Materna


La duración promedio de la lactancia en la ENDSSR 2004, para niños de 0 a 4 años es de 11.8 meses, similar a la de la ENSMI 1998 y a la ENDSR 1995/6. El 5 por ciento de los niños menores de 5 años nunca ha recibido lactancia materna. Del total de niños de 0 a 5 meses de edad incluidos en la encuesta solo el 21.9 por ciento tiene lactancia exclusiva (solo pecho) y el 27.6 por ciento recibió lactancia predominante (pecho, agua u otros líquidos excluyendo otro tipo de leche) (Gráfico 6.8).

Gráfico 6.7
Cobertura del esquema completo de inmunización con las 4 vacunas en conjunto (BCG, DPT, Polio y Sarampión) en niños/as de 12 a 23 meses de edad, por área de residencia, según ENDSR 1995/6 y ENDSSR 2004.



Fuente: ENDSR 1995/6, Cuadro 13.11 y ENDSSR 2004, Cuadro 27

Gráfico 6.8
Prevalencia de lactancia completa por área de residencia: Niños/as de 0 a 5 meses de edad, ENDSSR 2004.



(*) Pecho y agua u otros tipos de líquidos excluyendo otro tipo de leche

Fuente: Indicadores y Datos Básicos, ENDSSR 2004

7. CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE ITS, VIH/ SIDA

Por primera vez el CEPEP introduce en la encuesta nacional un módulo sobre conocimiento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), del Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/ SIDA) y las formas de transmisión y prevención. Se pregunta también a las mujeres de 15 a 44 años su percepción de riesgo personal para infectarse con el VIH/ SIDA.

7.1 Conocimiento de ITS y VIH/ SIDA


En Paraguay, 99.4 por ciento de la población de mujeres en edad fértil entrevistada conoce o ha escuchado hablar del SIDA. Entre las ITS, la más conocida es la sífilis (76.8 por ciento), seguida de gonorrea (73.4 por ciento), leucorrea (67 por ciento) y Candidiasis (57.9 por ciento). Por debajo de 50 por ciento de conocimiento están: herpes genital, condilomas, tricomoniasis y chlamydia (Gráfico 7.1).

El conocimiento sobre VIH/ SIDA también se determinó preguntando a las entrevistadas si sabían que una persona puede estar infectada del virus y no presentar síntomas. El 78.7 por ciento de las mujeres afirmaron que una persona puede ser portadora asintomática del VIH. La cifra asciende de 71.5 por ciento en el área rural a 82.6 por ciento en el área urbana. Por regiones, la proporción varía de 73.3 por ciento en la región Norte a 82.9 por ciento en la región de Gran Asunción (Cuadro 29).

7.2 Formas de prevención del VIH/ SIDA


Un indicador propuesto para analizar el conocimiento sobre VIH/ SIDA es que la entrevistada identifique espontáneamente y en conjunto, tres formas de prevención relacionadas con la actividad sexual: la abstinencia sexual, la fidelidad y el uso de condones en todas las

Gráfico 7.1
Conocimiento de ITS y VIH/ SIDA en Paraguay, ENDSSR 2004.



Fuente: Cuadro 28

Gráfico 7.2
Conocimiento de las tres formas de prevención en conjunto, ENDSSR 2004.




Fuente: Indicadores y Datos Básicos, ENDSSR 2004

relaciones sexuales. Se preguntó a cada mujer entrevistada qué formas conocía para que un hombre o una mujer pudiese prevenir infectarse del VIH/ SIDA. Si no respondía en forma espontánea, se preguntaba en forma dirigida para cada una de las formas de prevención.

A pesar del alto porcentaje de mujeres que afirmaron conocer el VIH/ SIDA, el conocimiento espontáneo de las tres formas de prevención de la infección apenas llega al 2.2 por ciento para el total del país. En forma dirigida, el conocimiento, en conjunto, sobre las tres formas para evitar la transmisión del VIH asciende a 78.8 por ciento a nivel total (Gráfico 7.2).

El conocimiento espontáneo de las tres formas de prevención en forma separada indica que el concepto más difundido es “usar condones en todas las relaciones sexuales” (35.7 por ciento), en menor proporción mencionaron la abstinencia sexual (14.4 por ciento) y la fidelidad (13.9 por ciento) (Gráfico 7.3).




En Paraguay apenas 2.2 por ciento puede mencionar espontáneamente y en conjunto tres formas de prevenir la infección del VIH/ SIDA.

7.3 Percepción de riesgo hacia el VIH/ SIDA

El 22.3 por ciento de las mujeres considera que tiene algún riesgo o mucho riesgo de infectarse con el VIH/ SIDA (Cuadro 31).

Dos de cada 9 mujeres considera tener algún riesgo de infectarse del VIH/ SIDA.

Las mayores proporciones de mujeres que consideran tener algún riesgo personal de adquirir el VIH/ SIDA, residen en el área urbana (24.7 por



ciento), tienen 12 y más años de educación (28.3 por ciento) o son sexualmente activas (26.8 por ciento) (Gráfico 7.4).

Como se muestra en el Gráfico 7.5, la proporción de mujeres que perciben tener algún riesgo de infectarse con el VIH/ SIDA es mayor entre las que viven en la región Gran Asunción (29.5 por ciento) y menor en las demás regiones: 19.8 por ciento en Centro Sur y 18.7 por ciento en la región Este y Norte.

7.4 Actitudes ante el VIH/ SIDA

Del total de las mujeres que conocen o han escuchado hablar del VIH/ SIDA, el 73.7 por ciento estaría dispuesta a recibir y cuidar en su casa a un pariente enfermo/a del VIH/ SIDA. El 38 por ciento preferiría mantener en secreto si un familiar resulta infectado.


Más de la mitad (53.3 por ciento) de las mujeres paraguayas en edad fértil aceptarían que una profesora infectada con el VIH, aunque no se vea enferma, siga dando clases. Mientras que solo 37.2 por ciento estarían dispuestas a comprar verduras o alimentos de un vendedor con SIDA.

Del total de mujeres que conocen o han escuchado hablar del VIH/SIDA, 38 de cada 100 preferiría mantener en secreto si un familiar resulta infectado.

Aproximadamente 1 de cada 2 mujeres (47.7 por ciento) estaría dispuesta que sus hijos compartan la misma escuela con un niño/ a infectado/ a con SIDA (Gráfico 7.6).


En todas las preguntas, la actitud de aceptación frente a las personas que viven con el VIH es más alta en el área urbana, en tanto que el rechazo o la discriminación con relación a los/ as infectados/ as del VIH es mayor entre las mujeres que residen en el área rural. (Indicadores y Datos Básicos de la ENDSSR 2004).

Gráfico 7.5
Percepción de algún riesgo de infectarse de VIH/ SIDA por región, ENDSSR 2004.



Fuente: Cuadro 31

Gráfico 7.6
Actitudes ante el VIH/SIDA, ENDSSR 2004.



Fuente: Indicadores y Datos Básicos, ENDSSR 2004

8 VIOLENCIA VERBAL, FÍSICA Y SEXUAL



En la ENDSR 95/6 y en la ENSMI 98 ya se habían incluido preguntas sobre violencia verbal y física contra las mujeres. En esta encuesta se agregaron preguntas sobre violencia sexual. Los resultados se refieren a la violencia recibida, por parte de una pareja o ex pareja, alguna vez en la vida y a la ocurrida en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta.

8.1 Violencia verbal, física y sexual, en mujeres casadas o unidas

Las mujeres de 15 a 44 años de edad, casadas o unidas actualmente o en el pasado, informaron sobre la forma de maltrato que habían recibido alguna vez por parte de alguna pareja o ex pareja. El 33.4 por ciento reportó haber sufrido violencia verbal, el 19.3 por ciento violencia física y 7.6 por ciento informó haber sido víctima de violencia sexual (Gráfico 8.1). Para analizar la violencia sexual, en la encuesta se preguntó a todas las mujeres casadas o unidas ahora o en el pasado, si alguna vez en su vida alguna pareja o ex pareja le había obligado a tener relaciones sexuales contra su voluntad.

Una de cada 3 mujeres casadas o unidas actualmente o en el pasado, reportó haber sufrido violencia verbal.

La violencia verbal hacia la mujer es más alta en el área urbana (37.7 por ciento) que en el área rural (26.6 por ciento). El porcentaje de violencia verbal por parte del esposo, compañero o novio hacia las divorciadas, separadas, o viudas (60.2 por ciento) resultó ser el doble con respecto a las



casadas o unidas actualmente (29.7 por ciento) (Gráfico 8.2).

La violencia física recibida por las mujeres alguna vez en su vida, por alguna pareja o ex pareja, también es mayor para las que residen en el área urbana (21.7 por ciento) y para las divorciadas, separadas o viudas (39.5 por ciento).

El mismo patrón se encontró en los casos de violencia sexual, siendo más frecuente en el área urbana (8.4 por ciento) y entre las divorciadas, separadas o viudas (17.5 por ciento).



Los porcentajes de mujeres casadas o unidas actualmente o en el pasado, que reportaron cualquier tipo de violencia en el último año, fueron: violencia verbal (14.3 por ciento), física (6.6 por ciento) y sexual (2.6 por ciento) (Gráfico 8.3).

Las mujeres del área urbana son las que en mayor proporción declararon haber sido víctimas de violencia verbal (15.7 por ciento) y física (7.1 por ciento) en los 12 meses anteriores a la encuesta.

Cualquiera sea el tipo de violencia, el porcentaje es mayor para las mujeres que tienen entre 15 y 19 años comparado con los otros grupos de edades: violencia verbal (17.1 por ciento), física (11.6 por ciento) y sexual (4.8 por ciento) (Cuadro 33, Gráfico 8.4).

En los últimos 12 meses, 1 de cada 20 adolescentes de 15 a 19 años fue víctima de violencia sexual por una pareja o ex pareja.

Entre las mujeres, casadas o unidas actualmente, o en el pasado, que informaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia en el año anterior a la encuesta, más de la mitad (56.8 por ciento) no acudió a nadie en busca de ayuda (Cuadro 34).




8.2 Violencia sexual en todas las mujeres de 15 a 44 años

A todas las mujeres entrevistadas independientemente de su estado civil, se les preguntó si alguna vez en su vida alguien la había obligado a tener relaciones sexuales con penetración (violación).

En el Gráfico 8.5 se observa que 6.5 por ciento de todas las mujeres de 15 a 44 años declaró que alguna vez en su vida alguien la obligó a tener relaciones sexuales contra su voluntad. Pudiendo ser los responsables del hecho alguna pareja o ex pareja, parientes o familiares, amigos, vecinos o desconocidos.

En Paraguay 1 de cada 15 mujeres fue obligada alguna vez en su vida a tener relaciones sexuales contra su voluntad (violación).

Los porcentajes de mujeres que declararon haber sido violadas son más altos entre las divorciadas, separadas o viudas (21 por ciento), frente a las casadas o unidas (7.4 por ciento) y a las solteras (2.5 por ciento) (Gráfico 8.5).



ANEXOS

Cuadros

Indicadores y Datos Básicos del Paraguay

ENDSSR 2004

CUADRO 1
Resultado de entrevistas por área de residencia y región, ENDSSR 2004.

RESULTADO DE ENTREVISTAS	TOTAL	ÁREA		REGIÓN			
		URBANA	RURAL	GRAN ASUNCIÓN	NORTE	CENTRO SUR	ESTE
N° DE VIVIENDAS	12236	6834	5402	2870	3172	3080	3114
Entrevista completa	99.4	99.2	99.6	98.6	99.5	99.8	99.6
Vivienda con MEF	61.4	62.7	59.8	62.9	61.6	58.3	63.1
Vivienda sin MEF	26.2	25.2	27.3	25.3	26.0	27.9	25.4
Vivienda Desocupada	11.8	11.3	12.4	10.4	11.9	13.6	11.0
Moradores Ausentes	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.1	0.3
Rechazo	0.2	0.4	0.1	0.7	0.0	0.1	0.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
MUJERES	7519	4286	3233	1804	1954	1795	1966
Entrevista completa	97.4	97.3	97.4	97.5	97.5	97.3	97.2
Ausentes	1.2	1.3	1.0	0.8	1.0	1.2	1.5
Rechazo	0.3	0.5	0.0	0.9	0.0	0.2	0.3
Otras Razones	1.2	0.8	1.6	0.8	1.5	1.3	1.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
TOTAL DE MUJERES CON ENTREVISTAS COMPLETAS	7321	4172	3149	1759	1905	1747	1910
TOTAL DE ENTREVISTAS COMPLETAS (%) (MEF)	96.8	96.5	97.0	96.1	97.0	97.1	96.8

NOTA: En este cuadro y en los subsiguientes, los subtotales pueden no sumar 100.0 debido al redondeo

CUADRO 2
Fuente de abastecimiento de agua y disponibilidad de bienes en las viviendas
por área de residencia y región, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	TOTAL	ÁREA		REGIÓN			
		URBANA	RURAL	GRAN ASUNCIÓN	NORTE	CENTRO SUR	ESTE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SERVICIO SANITARIO							
Agua de tubería	68.9	84.7	39.7	91.0	57.6	69.7	50.8
Baño moderno	67.6	87.1	31.6	92.4	32.4	59.8	62.9
DISPONIBILIDAD DE BIENES							
Electricidad	95.9	99.0	90.1	99.2	89.6	95.2	95.5
Radio	87.9	90.2	83.8	92.0	84.0	87.6	85.7
Televisión	85.4	92.9	71.4	94.9	65.4	84.8	83.8
Heladera	78.6	88.2	60.8	92.4	60.5	73.6	76.0
Teléfono Celular	53.3	65.4	30.9	72.8	21.8	41.0	56.2
Lavarropa	53.2	66.3	28.9	69.9	28.0	40.6	56.7
Auto particular	31.0	40.8	12.8	45.5	12.2	21.1	32.0
Video/DVD	26.7	36.6	8.2	42.0	9.7	16.8	26.2
Teléfono línea baja	25.2	37.5	2.3	43.2	6.5	14.5	23.4
Motocicleta	18.3	15.0	24.4	7.5	30.5	19.8	23.0
N° DE ENTREVISTADAS	7321	4172	3149	1759	1905	1747	1910

CUADRO 3							
Distribución porcentual de mujeres de 15 a 44 años de edad entrevistadas por grupos de edad según estado civil y educación, ENDSSR 2004.							
CARACTERÍSTICAS	TOTAL	EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS					
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
ESTADO CIVIL							
Unida	21.2	8.0	22.1	32.6	28.9	22.6	21.4
Casada	32.5	2.7	18.8	34.6	52.5	60.3	62.7
Divorciada	0.3	0.0	0.0	0.2	1.2	0.6	0.5
Separada	6.5	2.5	6.8	8.7	8.8	7.7	7.7
Viuda	0.6	0.0	0.2	0.5	0.7	1.4	1.9
Soltera	38.9	86.8	52.2	23.4	7.9	7.3	5.8
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)							
0-2	3.9	1.5	2.6	3.5	4.5	5.5	9.4
3-5	12.6	6.0	6.8	13.2	16.3	19.4	24.0
6	21.7	14.9	16.1	23.5	29.4	29.3	26.5
7-11	29.3	63.1	22.0	19.0	17.1	18.0	13.6
12	15.3	12.0	25.4	14.7	13.6	10.6	11.6
13 y +	17.2	2.5	27.1	26.1	19.1	17.2	14.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
N° DE MUJERES CON ENTREVISTA COMPLETA							
	7321	1446	1527	1308	1142	1036	862

CUADRO 4
Características de mujeres de 15 a 44 años de edad entrevistadas por área de residencia y región, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	TOTAL	ÁREA		REGIÓN			
		URBANA	RURAL	GRAN ASUNCIÓN	NORTE	CENTRO SUR	ESTE
EDAD (AÑOS CUMPLIDOS)							
15-19	24.3	24.1	24.5	23.7	27.3	23.4	24.3
20-24	22.0	23.5	19.2	23.9	18.3	20.2	23.1
25-29	15.5	15.5	15.5	16.0	16.3	14.3	15.7
30-34	12.9	12.7	13.4	12.8	13.0	12.6	13.3
35-39	13.3	12.7	14.4	12.6	13.1	14.8	12.8
40-44	12.0	11.5	13.0	11.1	12.0	14.7	10.7
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)							
0-2	3.9	2.0	7.5	1.0	7.2	3.9	5.6
3-5	12.6	6.5	23.8	5.1	20.3	14.4	15.5
6	21.7	16.7	30.9	16.2	26.3	26.9	21.0
7-11	29.3	32.3	23.9	31.6	28.2	27.4	29.3
12	15.3	19.4	7.7	22.0	9.1	13.4	12.7
13 y +	17.2	23.1	6.2	24.2	8.9	14.1	15.9
ACTIVIDAD ECONÓMICA							
No trabaja	54.9	47.5	68.7	44.7	68.5	57.8	57.5
Trabaja fuera de la casa	31.6	39.2	17.4	41.4	18.1	27.3	30.5
Trabaja dentro de la casa	13.5	13.3	13.9	13.9	13.4	14.9	11.9
PORCENTAJE CON SEGURO MÉDICO							
Seguro IPS	11.3	13.6	7.0	15.1	9.3	11.2	8.3
Seguro Privado	9.3	13.1	2.2	16.0	3.3	5.3	8.2
Seguro IPS y Privado	1.6	2.2	0.3	2.8	0.6	0.9	1.2
Otro	1.4	1.5	1.4	2.2	0.7	2.0	0.5
Ninguno	76.4	69.6	89.1	63.9	86.1	80.5	81.8
IDIOMA QUE HABLAN EN LA CASA							
Guaraní	30.4	12.4	63.7	6.9	69.2	39.1	31.9
Español y Guaraní	35.6	42.5	22.9	40.8	19.7	41.9	31.0
Español	31.2	43.8	7.8	51.7	8.9	18.6	29.9
Portugués	2.1	0.7	4.8	0.2	2.1	0.0	5.9
Otro	0.7	0.6	0.8	0.4	0.1	0.4	1.3
ESTADO CIVIL							
Unida	21.2	19.5	24.3	19.5	27.2	21.6	20.3
Casada	32.5	29.5	37.9	27.9	31.2	36.2	34.3
Divorciada	0.3	0.4	0.1	0.7	0.2	0.3	0.1
Separada	6.5	7.6	4.7	7.9	6.6	5.1	6.4
Viuda	0.6	0.6	0.7	0.2	0.9	0.8	0.8
Soltera	38.9	42.4	32.3	43.9	33.9	36.0	38.1
HIJOS NACIDOS VIVOS							
0	40.2	43.8	33.3	45.1	34.6	36.9	40.1
1	16.6	17.7	14.6	18.7	14.5	15.7	16.0
2	14.7	15.5	13.4	15.6	14.1	14.4	14.4
3	10.6	10.0	11.6	8.3	10.7	12.0	11.5
4	7.2	6.3	8.7	6.5	7.6	7.7	7.1
5-6	6.4	4.6	9.7	3.7	10.6	7.2	6.8
7 y +	4.4	2.2	8.5	2.0	7.9	6.0	4.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nº DE MUJERES CON ENTREVISTA COMPLETA	7321	4172	3149	1759	1905	1747	1910

CUADRO 5
Distribución porcentual del total de mujeres entrevistadas y de las actualmente casadas/unidas por grupos de edad (comparación CENSO 2002, ENSMI 98, ENDSSR 2004).

GRUPOS DE EDAD	TOTAL DE MUJERES		
	ENDSSR-2004 (I.C.) *	CENSO 2002 **	ENSMI-98
15-19	24.3 (1.2)	24.5	23.4
20-24	22.0 (1.2)	20.2	19.1
25-29	15.5 (1.0)	15.6	17.2
30-34	12.9 (1.0)	14.4	15.7
35-39	13.3 (1.0)	13.3	13.5
40-44	12.0 (0.9)	11.9	11.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0
GRUPOS DE EDAD	PORCENTAJE DE MUJERES ACTUALMENTE CASADAS/UNIDAS		
	ENDSSR-2004 (I.C.) *	CENSO 2002 **	ENSMI-98
TOTAL	53.7 (1.4)	54.1	61.3
15-19	10.7 (2.0)	11.7	13.4
20-24	40.9 (3.1)	43.5	50.0
25-29	67.2 (3.2)	69.0	77.4
30-34	81.4 (2.8)	79.0	86.4
35-39	82.9 (2.9)	80.9	84.7
40-44	84.1 (3.1)	80.0	88.8

(*) Intervalo de confianza de 95% en puntos porcentuales, asumiendo un efecto de diseño = 1,5

(**) Informe Final, CENSO 2002. DGEEC.

CUADRO 6
Tendencias de la Tasa Global de Fecundidad y Tasas Específicas de Fecundidad por edad,
según varias fuentes y períodos (mujeres 15-44 años).

A. Evolución de las Tasas de Fecundidad por edad (por 1.000 mujeres) y Tasa Global de Fecundidad (TGF) según varias fuentes y períodos.

EDAD	ENDS-90	ENDSR-95/6	ENSMI-98	ENDSSR-2004 (*)		
	87-90	90-95	95-98	95-98	98-01	01-04
15-19	97	107	87	90	67	65
20-24	208	212	216	206	164	150
25-29	214	215	214	204	161	142
30-34	196	158	167	152	125	122
35-39	142	116	132	127	101	69
40-44	70	61	37	*	*	36
TGF (15-44)	4.6	4.3	4.3	3.9	3.4	2.9

B. Tasa Global de Fecundidad (TGF) por área y región según varias fuentes y períodos.

ÁREA	ENDS-90	ENDSR-95/6	ENSMI-98	ENDSSR-2004
	1987-1990 (**)	1990-1995 (***)	1995-1998	2001-2004
Urbana	3.6	3.3	3.2	2.5
Rural	6.0	5.7	5.6	3.7
REGIÓN				
Gran Asunción	3.5	2.9	2.9	2.4
Norte	6.7	5.6	-	3.9
Centro Sur	4.8	4.7	-	3.1
Este	5.6	5.1	-	3.0
TGF (15-44)	4.6	4.3	4.3	2.9

(*) Tres períodos de 36 meses (de marzo a febrero)

(*) Menos de 25 nacimientos

(**) Mujeres de 15-49 años

(***) Mujeres de 15-49 años para área y región

CUADRO 7
Tasas Específicas de Fecundidad por edad (por 1.000 mujeres) y Tasa Global de Fecundidad (TGF),
según área, región, educación e idioma habitualmente hablado en el hogar, período:
marzo 2001 – febrero 2004, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	GRUPOS DE EDAD						
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	TGF (15-44)
TOTAL	65	150	142	122	69	36	2.9
ÁREA							
Urbana	52	125	124	115	55	32	2.5
Rural	91	209	173	133	91	43	3.7
REGIÓN							
Gran Asunción	44	128	106	108	62	*	2.4
Norte	97	208	180	139	101	*	3.9
Centro Sur	67	172	140	117	69	*	3.1
Este	73	140	163	131	62	*	3.0
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)							
0-5	136	249	190	144	83	*	4.2
6	153	217	151	120	70	52	3.8
7-11	54	188	146	116	55	*	2.9
12 y +	26	89	109	111	60	*	2.1
IDIOMA HABLADO EN EL HOGAR							
Guaraní	99	209	182	142	99	53	3.9
Español y guaraní	54	139	133	115	51	31	2.6
Español	22	117	110	107	59	23	2.3

* Número insuficiente de casos: menos de 25 nacimientos.

CUADRO 8
Tasas Específicas de Fecundidad por edad (por 1.000 mujeres) y Tasa Global de Fecundidad (TGF)
de algunos países seleccionados de Sudamérica.

EDAD	PAÍS Y PERÍODO					
	Bolivia (1) (1995-98)	Brasil (2) (1993-96)	Colombia (3) (1997-2000)	Ecuador (4) (1994-99)	Paraguay (5) (2001-2004)	Perú(6) (1998-2000)
15-19	84	86	85	89	65	66
20-24	207	152	142	172	150	140
25-29	201	123	129	155	142	134
30-34	165	81	99	119	122	112
35-39	117	46	49	76	69	79
40-44	57	16	15	37	36	32
TGF (15-44)	4.2	2.5	2.6	3.3	2.9	2.8

(1) ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD, 1998 - BOLIVIA

(2) PESQUISA NACIONAL SOBRE DEMOGRAFIA E SAUDE, 1996 - BRASIL

(3) ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD, 2000 - COLOMBIA

(4) ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD MATERNA E INFANTIL, 1999 - ECUADOR

(5) ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ENDSSR 2004 – PARAGUAY

(6) ORC MACRO, 2004. MEASUREDHS: STAT COMPILER. Htt9://www.MEASUREdhs.com, 8/23/04

CUADRO 9
Distribución porcentual de los nacimientos ocurridos durante el período marzo 1999 a febrero 2004, por intención reproductiva de la madre, según características seleccionadas, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	DESEO DEL HIJO				NÚMERO DE CASOS*
	QUERÍA ENTONCES	QUERÍA ESPERAR	NO QUERÍA MÁS HIJOS	TOTAL	
TOTAL	72.1	18.7	9.2	100.0	4023
ÁREA					
Urbana	70.8	19.6	9.6	100.0	1859
Rural	73.7	17.5	8.8	100.0	2164
REGIÓN					
Gran Asunción	71.1	18.7	10.2	100.0	732
Norte	73.3	18.4	8.3	100.0	1312
Centro Sur	70.9	19.1	10.0	100.0	947
Este	73.3	18.4	8.2	100.0	1032
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)					
0-2	71.2	15.4	13.3	100.0	305
3-5	74.8	13.0	12.3	100.0	844
6	71.3	18.3	10.4	100.0	1221
7-11	67.4	23.5	9.1	100.0	829
12 y +	75.4	20.1	4.5	100.0	824
NÚMERO DE HIJOS VIVOS					
0	**	**	**	100.0	17
1	76.6	21.5	1.9	100.0	849
2	75.2	20.9	3.9	100.0	935
3	71.3	18.7	10.0	100.0	778
4	69.5	17.5	13.1	100.0	530
5	66.2	14.9	18.9	100.0	313
6 y +	65.9	12.6	21.5	100.0	601

* Excluye 2 casos que No sabe/No responde

** Menos de 25 casos

CUADRO 10
Porcentaje de todas las mujeres y mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad que conocen anticonceptivos por área de residencia y región, según método específico, ENDSSR 2004.

MÉTODOS	TOTAL	ÁREA		REGIÓN			
		URBANA	RURAL	GRAN ASUNCIÓN	NORTE	CENTRO SUR	ESTE
TODAS LAS MUJERES							
Nº DE CASOS	7321	4172	3149	1759	1905	1747	1910
Condón	99.4	99.7	98.9	99.6	97.9	99.5	99.6
Píldora	98.1	98.7	97.0	98.6	95.8	98.8	98.0
Inyección	97.0	97.3	96.3	96.5	95.6	97.8	97.3
Esterilización femenina	91.5	92.8	89.2	91.2	86.6	91.6	93.5
DIU	90.2	91.7	87.4	92.2	86.5	92.0	88.1
Ritmo	80.0	83.7	73.0	78.8	75.6	80.1	82.7
Retiro	71.1	74.8	64.3	72.2	65.2	71.0	72.2
Métodos vaginales	57.1	62.6	46.7	62.8	46.5	55.1	57.0
Condón femenino	54.0	62.5	38.2	64.9	42.5	47.2	53.3
Vasectomía	41.8	48.9	28.5	49.9	29.0	37.1	42.4
Métodos Billings	38.0	45.3	24.4	44.3	24.8	35.3	38.9
Norplant	8.2	9.8	5.1	9.8	6.2	7.0	8.2
Yuyos	86.5	86.2	87.2	83.8	88.8	89.3	85.9
Pastilla de Emergencia	37.2	43.6	25.3	43.2	28.0	34.3	37.1
MUJERES EN UNIÓN							
Nº DE CASOS	4564	2358	2206	966	1268	1126	1204
Condón	99.6	99.8	99.1	99.8	98.5	99.6	99.7
Píldora	99.0	99.3	98.6	99.5	97.6	99.1	99.0
Inyección	98.5	98.9	98.0	98.1	97.2	99.2	98.8
DIU	96.6	98.1	94.4	98.9	93.4	97.9	94.7
Esterilización femenina	95.5	96.6	93.8	95.7	91.9	94.6	97.5
Ritmo	81.5	86.1	74.7	81.1	78.4	81.6	82.8
Retiro	77.7	81.6	71.9	78.7	73.0	76.9	79.4
Métodos vaginales	58.1	65.2	47.7	66.9	48.4	55.7	56.6
Condón femenino	46.9	55.5	34.2	56.6	38.5	41.7	46.6
Vasectomía	41.4	49.3	29.9	49.5	30.9	36.2	43.4
Método de Billings	37.9	47.4	24.1	47.5	23.8	33.2	39.5
Norplant	7.3	9.1	4.6	8.0	6.6	6.0	8.1
Yuyos	89.8	89.5	90.3	86.2	94.6	92.1	89.0
Pastilla de Emergencia	30.6	36.6	21.9	35.1	25.2	29.0	30.4

CUADRO 11
Tendencia de la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad, según características seleccionadas, por diferentes encuestas desde 1987 hasta 2004.

CARACTERÍSTICAS	ENCUESTAS				
	EPF - 1987	ENDS - 90(a)	ENDSR - 95/6(a)	ENSMI - 98	ENDSSR - 2004
TOTAL	37.6	44.1	50.7	57.4	72.8
ÁREA					
Urbana	-	53.3	56.2	65.4	76.5
Rural	-	33.5	45.0	49.3	67.4
REGIÓN					
Gran Asunción	52.3	55.9	58.8	66.0	74.5
Norte	-	30.6	41.9	-	61.3
Centro Sur	-	38.4	47.5	-	76.2
Este	-	40.7	50.2	-	72.8
NIVEL DE INSTRUCCIÓN					
0-2 años	-	25.6	32.6	36.5	61.1
3-5 años	25.9*	35.2	43.0	52.9	66.8
Primaria Completa	37.7	47.4	51.4	53.7	70.8
Secundaria Incompleta	-	-	-	67.5	74.1
Secundaria o más	60.6	61.3	64.4	69.4	-
Secundaria Completa y +	-	-	-	-	80.1
EDAD					
15-19	22.5	31.1	37.2	42.2	60.8
20-24	37.3	37.5	49.2	57.2	71.3
25-29	43.2	49.9	56.1	55.9	71.6
30-34	38.9	49.3	57.4	57.5	73.6
35-39	38.7	50.5	57.7	64.7	74.5
40-44	31.6	41.5	48.0	56.2	75.7
45-49	-	32.7	25.9	-	-
HIJOS NACIDOS VIVOS					
0	21.7	19.4	25.0	24.9	47.6
1	34.2	40.5	51.2	60.9	72.0
2	51.9	54.2	60.0	69.0	77.6
3	50.0	55.7	57.3	69.0	80.8
4	42.4	40.3**	51.1	63.8	79.1
5-6	29.9	-	36.0	50.9	69.0***
7 y +	14.8	-	-	42.1	-

(a) Mujeres de 15 a 49 años
 * Ninguna y primaria incompleta
 ** 4 o más hijos nacidos vivos
 *** 5 o más hijos nacidos vivos

CUADRO 12

Tendencia de la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad, según método utilizado, de acuerdo a diferentes encuestas desde 1987 hasta 2004.

USO Y MÉTODO	ENCUESTAS				
	EPF- 1987	ENDS - 90(a)	ENDSR - 95/6(a)	ENSMI - 98	ENDSSR - 2004
USAN	37.6	44.1	50.7	57.4	72.8
MÉTODOS MODERNOS	29.0	35.2	41.3	47.7	60.5
Píldora	13.5	13.6	13.5	13.1	15.0
DIU	5.1	5.7	7.6	11.1	11.5
Condón	2.3	2.6	6.5	7.3	11.9
Esterilización femenina	4.0*	7.4	6.8	8.0	11.5
Vasectomía	—	0.0	0.0	0.0	0.1
Inyección	3.6	5.2	6.2	7.5	10.4
Métodos vaginales	0.5	0.8	0.7	0.5	0.2
MÉTODOS TRADICIONALES	8.5	8.9	9.5	9.7	12.3
Ritmo	3.8	3.3	3.0	2.8	6.7
Retiro	2.9	2.9	3.4	5.4	4.5
Billings	1.9	2.0	3.1	1.5	1.0
Otros	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
NO USAN	62.4	55.9	49.3	42.6	27.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nº DE CASOS	1416	3574	4586	2386	4564

(a) Mujeres de 15 a 49 años.

(*) Incluye 1 caso de vasectomía

1987 ENCUESTA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

1990 ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD

1995/6 ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD REPRODUCTIVA

1998 ENCUESTA NACIONAL DE SALUD MATERNO INFANTIL

2004 ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

CUADRO 13
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en países seleccionados de Sudamérica.
Distribución porcentual de mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad.

USO Y MÉTODO	PAÍS Y PERÍODO					
	BOLIVIA (1) 1998	BRASIL (2) 1996	COLOMBIA (3) 2000	ECUADOR (4) 1999	PARAGUAY (5) 2004	PERÚ(6) 2000
USAN	47.5	76.4	75.5	65.8	72.8	67.3
MÉTODOS MODERNOS	25.2	70.3	63.3	51.5	60.5	49.8
Píldora	3.8	20.7	11.8	11.1	15.0	6.7
DIU	11.1	1.1	12.4	10.1	11.5	9.1
Condón	2.6	4.4	6.1	2.7	11.9	5.6
Esterilización Femenina	6.5	40.1	27.1	22.5	11.5	12.3
Vasectomía	0.0	2.6	1.0	0.0	0.1	0.5
Inyección	1.1	1.2	4.0	3.5	10.4	14.8
Métodos vaginales	0.0	0.1	0.8	0.2	0.2	0.6
Otros	-	0.0	0.2	1.4	0.0	0.2
MÉTODOS TRADICIONALES	22.3	6.1	12.3	14.4	12.3	17.5
Ritmo	20.0	3.0*	6.0*	7.9*	6.7	14.4*
Retiro	2.3	3.1	6.3	6.5	4.5	3.2
Billings	-	-	-	-	1.0	-
NO USAN (**)	52.5	23.6	24.5	34.2	27.2	32.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nº DE CASOS	6649	7584	5935	9583	4564	15628

(1) ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD, 1998 - BOLIVIA

(2) PESQUISA NACIONAL SOBRE DEMOGRAFIA E SAÚDE, 1996 - BRASIL

(3) ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD, 2000 - COLOMBIA

(4) ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD MATERNA E INFANTIL, 1999 - ECUADOR

(5) ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ENDSSR 2004 – PARAGUAY

(6) ORC MACRO, 2004. MEASUREDHS: STAT COMPILER. [Http://www.MEASUREdhs.com](http://www.MEASUREdhs.com), 8/23/04

(*) Incluye método Billings

(**) Para efecto de comparación se incluyó método MELA y folclórico, para Colombia y Perú; folclórico en Bolivia y Paraguay; ervas, chás, etc. en Brasil

CUADRO 14
Distribución porcentual del uso actual de métodos anticonceptivos en mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad, por área de residencia y región, según método, ENDSSR 2004.

MÉTODO	TOTAL	ÁREA		REGIÓN			
		URBANA	RURAL	GRAN ASUNCIÓN	NORTE	CENTRO SUR	ESTE
USAN ACTUALMENTE	72.8	76.5	67.4	74.5	61.3	76.2	72.8
MÉTODOS MODERNOS	60.5	64.2	55.1	62.3	49.8	63.7	60.3
Píldora	15.0	11.8	19.6	10.8	18.8	16.2	15.8
Condón	11.9	13.9	9.0	14.2	6.7	13.1	10.8
Esterilización femenina	11.5	13.3	8.8	11.6	7.9	9.5	14.5
DIU	11.5	13.5	8.6	16.5	6.8	13.8	6.9
Inyección	10.4	11.5	8.8	8.8	9.5	10.7	11.8
Métodos vaginales	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.3
Vasectomía	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
MÉTODOS TRADICIONALES	12.3	12.3	12.3	12.2	11.5	12.6	12.4
Ritmo	6.7	6.7	6.7	6.7	7.4	7.4	5.8
Retiro	4.5	4.0	5.4	3.6	4.0	4.4	5.7
Billings	1.0	1.6	0.3	1.9	0.1	0.7	0.9
NO USAN	27.2	23.5	32.6	25.5	38.7	23.8	27.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
N° DE CASOS	4564	2358	2206	966	1268	1126	1204

CUADRO 15

Distribución porcentual del uso actual de métodos anticonceptivos en mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad, por método, según características seleccionadas, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	USO ACTUAL TOTAL		MÉTODOS MODERNOS							MÉTODOS TRADICIONALES			NO USAN ACTUALMENTE	TOTAL	Nº DE CASOS
	Píldora	Condón	Esterilización Femenina	DIU	Inyección	Métodos Vaginales	Vasectomía	Ritmo	Retiro	Métodos Billings					
TOTAL	15.0	11.9	11.5	11.5	10.4	0.2	0.1	6.7	4.5	1.0	27.2	100.0	4564		
EDAD															
15-19	17.0	13.6	0.0	2.8	14.1	0.0	0.0	5.4	7.8	0.0	39.2	100.0	232		
20-24	19.3	11.4	0.5	13.6	16.8	0.0	0.0	5.3	4.3	0.1	28.7	100.0	785		
25-29	18.2	12.5	2.6	13.0	15.5	0.1	0.1	5.5	3.6	0.5	28.4	100.0	973		
30-34	15.7	13.2	11.5	11.9	9.9	0.1	0.5	6.2	4.4	0.3	26.4	100.0	968		
35-39	12.0	11.1	18.6	11.4	5.7	0.3	0.1	8.5	4.4	2.3	25.5	100.0	891		
40-44	9.7	10.7	25.3	9.9	4.2	0.4	0.0	8.2	5.2	2.1	24.3	100.0	715		
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)															
0-2	17.0	2.7	17.0	5.2	5.7	0.0	0.0	5.0	8.1	0.4	38.9	100.0	287		
3-5	19.4	7.2	14.0	7.4	4.9	0.2	0.6	6.5	6.3	0.2	33.2	100.0	902		
6	16.2	12.5	8.9	10.8	10.6	0.2	0.0	5.7	5.4	0.5	29.2	100.0	1333		
7-11	12.4	13.0	9.6	13.7	13.4	0.1	0.0	7.4	4.0	0.5	25.9	100.0	916		
12 y +	12.3	15.3	12.6	14.4	12.5	0.2	0.1	7.8	2.2	2.7	19.9	100.0	1126		
Nº HIJOS VIVOS															
0	14.4	11.1	0.7	1.6	9.7	0.0	0.0	6.7	2.5	0.2	52.9	100.0	417		
1	16.9	12.7	1.1	12.5	16.6	0.2	0.0	6.7	4.9	0.7	27.7	100.0	977		
2	17.7	13.3	6.1	16.6	11.6	0.3	0.1	7.5	3.8	0.9	22.1	100.0	1070		
3	12.6	13.6	21.1	10.9	8.8	0.2	0.6	7.1	3.7	2.3	19.1	100.0	807		
4	14.8	9.9	21.7	11.8	7.7	0.2	0.0	5.2	5.2	1.7	21.7	100.0	524		
5	11.9	12.9	24.4	11.2	4.4	0.0	0.0	5.4	5.4	0.9	23.6	100.0	296		
6 y +	11.0	6.4	19.3	7.8	4.5	0.0	0.0	6.9	7.5	0.0	36.5	100.0	473		

CUADRO 16
Distribución Porcentual de fuente de obtención de anticonceptivos modernos en mujeres
de 15 a 44 años de edad que usan actualmente estos métodos, ENDSSR 2004.

FUENTE DE OBTENCIÓN	TOTAL*	PÍLDORA	DIU	CONDÓN	INYECCIÓN	ESTERILIZACIÓN FEMENINA/ VASECTOMÍA
Farmacia	49.7	61.1	0.0	85.5	75.7	0.0
Sector público	31.7	31.2	64.4	8.5	16.5	51.6
Sector privado	11.6	1.6	28.2	0.4	3.2	36.1
Brasil	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2
Argentina	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
Otro	5.2	6.1	7.4	5.1	4.6	2.1
No sabe	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nº DE CASOS	3223	872	536	722	596	497

* Excluye 10 casos usando métodos Vaginales

CUADRO 17
Porcentaje de mujeres de 15 a 44 años de edad que necesitan servicios de planificación familiar por área de residencia, región y estado civil, ENDSSR 2004.

DEMANDA POTENCIAL DE SERVICIOS DE PF	TOTAL	ÁREA		REGIÓN				ESTADO CIVIL		
		URBANA	RURAL	GRAN ASUNCIÓN	NORTE	CENTRO SUR	ESTE	CASADA/ UNIDA	SEP/DIV/ VIUDA	SOLTERA
MUJERES QUE NO NECESITAN SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	40.3	40.3	40.0	42.4	43.2	38.7	38.4	16.5	43.3	72.4
Nunca ha tenido RS	21.0	20.9	21.1	21.2	22.2	20.4	20.9	0.0	0.0	54.0
No sexualmente activa	9.8	10.5	8.3	11.3	10.4	9.2	8.5	1.8	35.8	15.7
Embarazada	5.1	4.3	6.6	4.8	6.4	4.8	5.2	8.0	3.1	1.5
Desea embarazo	3.0	3.3	2.5	4.0	2.3	2.8	2.5	4.6	2.7	0.9
Infértil o subfecunda	1.4	1.3	1.5	1.1	1.9	1.5	1.3	2.1	1.7	0.3
MUJERES QUE NECESITAN SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	59.8	59.7	60.0	57.8	56.9	61.2	61.6	83.5	56.7	27.6
Usa método moderno	41.9	43.5	38.9	42.5	33.9	43.8	42.5	60.4	40.7	16.5
Usa método tradicional	8.5	8.6	8.4	8.9	7.5	8.6	8.6	12.3	4.6	4.1
NO USUARIAS EN RIESGO DE UN EMBARAZO NO DESEADO	9.4	7.6	12.7	6.4	15.5	8.8	10.5	10.8	11.4	7.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
NO USUARIAS QUE NECESITAN MÉTODO MODERNO *	17.9	16.2	21.0	15.2	22.9	17.4	19.1	23.1	16.0	11.1
NÚMERO DE CASOS	7321	4172	3149	1759	1905	1747	1910	4564	531	2226

* Incluye mujeres que usan método tradicional y no usuarias en riesgo de embarazo no deseado

CUADRO 18
Distribución porcentual de mujeres de 15 a 24 años de edad por número y promedio de embarazos,
según edad, área de residencia y región, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	NÚMERO DE EMBARAZOS				TOTAL	PROMEDIO DE EMBARAZOS (15-24)	NÚMERO DE MUJERES (15-24)
	0	1	2	3 y más			
TOTAL	72.1	16.1	7.2	4.6	100.0	0.5	2973
EDAD							
15-17	95.2	3.9	0.9	0.1	100.0	0.1	881
18-19	78.9	14.9	5.3	0.9	100.0	0.3	565
20-22	62.0	22.6	10.2	5.3	100.0	0.6	920
23-24	38.9	29.3	15.9	15.8	100.0	1.2	607
15-19	89.1	8.0	2.5	0.4	100.0	0.1	1446
20-24	53.5	25.0	12.3	9.2	100.0	0.8	1527
ÁREA							
Urbana	75.0	15.7	5.8	3.4	100.0	0.4	1761
Rural	66.3	16.9	10.0	6.9	100.0	0.6	1212
REGIÓN							
Gran Asunción	74.9	16.0	5.6	3.5	100.0	0.4	736
Norte	67.1	17.1	9.1	6.7	100.0	0.6	768
Centro Sur	72.2	15.2	7.4	5.2	100.0	0.5	674
Este	71.1	16.5	7.9	4.5	100.0	0.5	795

CUADRO 19
Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años de edad que reportaron haber tenido su primera relación sexual, según edad, área de residencia, región y educación, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	TUVO RELACIONES SEXUALES	RELACIONES SEXUALES		NO TUVO RELACIONES	TOTAL	NÚMERO DE CASOS
		PREMARITAL	MARITAL			
TOTAL	57.4	53.5	3.9	42.6	100.0	2973
EDAD						
15-17	22.3	21.3	1.1	77.7	100.0	881
18-19	57.9	55.3	2.7	42.1	100.0	565
20-22	76.3	70.0	6.3	23.7	100.0	920
23-24	89.9	83.3	6.6	10.1	100.0	607
15-19	35.8	34.1	1.7	64.2	100.0	1446
20-24	81.3	74.9	6.4	18.7	100.0	1527
ÁREA						
Urbana	59.1	57.6	1.5	40.9	100.0	1761
Rural	54.2	45.3	8.9	45.8	100.0	1212
REGIÓN						
Gran Asunción	58.9	58.3	0.6	41.1	100.0	736
Norte	53.4	46.3	7.1	46.6	100.0	768
Centro Sur	55.7	50.1	5.6	44.3	100.0	674
Este	58.8	54.0	4.8	41.2	100.0	795
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)						
0-5	72.8	59.9	12.9	27.2	100.0	304
6	67.3	59.9	7.4	32.7	100.0	528
7-11	42.0	39.8	2.2	58.0	100.0	1246
12 y +	69.5	67.3	2.2	30.5	100.0	895

CUADRO 20

Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años de edad que reportaron haber tenido relaciones sexuales premaritales en Gran Asunción y Resto del País, según edad, comparado con encuestas anteriores, 1987, 1995, 1998 y 2004.

RESIDENCIA	EPF-1987			ENDSR-1995/6			ENSMI-1998*			ENDSSR-2004						
	TOTAL	EDAD		TOTAL	EDAD		TOTAL	EDAD		TOTAL	EDAD					
		15-19	20-24		Nº DE CASOS	15-19		20-24	Nº DE CASOS		15-19	20-24	Nº DE CASOS	15-19	20-24	
TOTAL	35.1	21.2	48.7	875	47.0	30.9	68.1	2136	44.5	30.0	62.2	1351*	53.5	34.1	74.9	2973
REGIÓN																
Gran Asunción	39.5	25.1	52.8	428	52.5	36.5	73.7	513	48.6	29.8	66.1	399	58.3	37.2	79.3	736
Resto del País	33.1	19.5	46.8	447	44.7	28.6	65.7	1618	42.7	30.0	60.2	952	51.3	32.8	72.7	2237

*Excluye 10 mujeres cuya primera relación fue una violación y 7 mujeres sin información.

CUADRO 21
Distribución porcentual de mujeres de 15 a 24 años de edad que reportaron haber tenido relaciones sexuales premaritales por edad a la primera relación, según área de residencia, región y educación, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	EDAD CUANDO LA PRIMERA RELACIÓN						TOTAL	N° DE CASOS
	<15	15	16-17	18-19	20-24	NO SABE		
TOTAL	15.3	17.9	34.9	23.3	8.2	0.4	100.0	1685
ÁREA								
Urbana	13.2	17.0	35.0	25.2	9.2	0.3	100.0	1076
Rural	20.5	20.1	34.6	18.4	5.8	0.5	100.0	609
REGIÓN								
Gran Asunción	13.3	16.9	34.6	23.0	12.0	0.3	100.0	460
Norte	18.7	21.1	36.4	20.0	3.7	0.0	100.0	392
Centro Sur	15.1	19.0	34.6	23.7	7.0	0.6	100.0	366
Este	16.4	17.2	35.1	24.4	6.5	0.4	100.0	467
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)								
0-5	36.1	29.2	20.7	12.7	1.2	0.0	100.0	189
6	20.3	25.0	34.4	17.3	2.9	0.0	100.0	334
7-11	18.1	23.5	42.1	13.7	2.2	0.4	100.0	541
12 y +	6.1	7.9	32.7	35.8	16.9	0.6	100.0	621

CUADRO 22.
Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años de edad que usó anticonceptivos en su primera relación sexual,
por estado civil a la primera relación sexual, según edad, área de residencia,
región y educación, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	TOTAL MUJERES		ESTADO CIVIL CUANDO LA PRIMERA RELACIÓN			
			ANTES DE UNIÓN		CASADAS O UNIDAS	
	%	Nº DE CASOS	%	Nº DE CASOS	%	Nº DE CASOS
TOTAL*	56.3	1832	57.6	1649	39.5	183
EDAD CUANDO LA PRIMERA RELACIÓN						
< 15	45.2	263	46.8	244	**	19
15	48.5	343	49.0	312	41.7	31
16-17	57.4	675	58.5	602	42.0	73
18-19	66.7	395	68.1	361	47.7	34
20-24	59.1	152	62.3	126	33.5	26
ÁREA						
Urbana	61.2	1088	61.6	1050	48.9	38
Rural	45.5	744	47.3	599	36.3	145
REGIÓN						
Gran Asunción	62.4	460	62.6	454	**	6
Norte	39.0	461	39.9	387	32.9	74
Centro Sur	51.8	404	53.1	355	40.4	49
Este	59.2	507	60.9	453	41.7	54
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)						
0-5	35.9	231	38.4	180	25.1	51
6	42.9	384	43.7	326	37.0	58
7-11	57.9	584	58.9	535	41.5	49
12 y +	66.5	633	66.6	608	62.5	25

* Excluye 36 casos reportando violación como la primera relación

** Menos de 25 casos

CUADRO 23

Tendencia del uso de métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 24 años de edad en su primera relación sexual, por estado civil cuando la primera relación, según diferentes encuestas desde 1987 hasta 2004.

ENCUESTA	ESTADO CIVIL CUANDO LA PRIMERA RELACIÓN					
	TOTAL MUJERES		ANTES DE UNIÓN		CASADAS O UNIDAS	
	% USANDO	Nº DE CASOS	% USANDO	Nº DE CASOS	% USANDO	Nº DE CASOS
EPF 1987	12.2	326	—	—	—	—
ENDSR 1995/6	23.6	1364	23.5	1080	24.2	284
ENSMI 1998	31.3	778	33.2	652	21.6	126
ENDSSR 2004	56.3	1832	57.6	1649	39.5	183

CUADRO 24
Porcentaje y Distribución Porcentual de atención prenatal para nacimientos vivos en el
período marzo de 1999 a febrero de 2004, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	TOTAL	ÁREA		REGIÓN			
		URBANA	RURAL	GRAN ASUNCIÓN	NORTE	CENTRO SUR	ESTE
CONTROL PRENATAL							
Sí	94.2	96.5	91.2	95.9	89.9	97.0	92.3
No	5.8	3.5	8.8	4.1	10.1	3.0	7.7
MESES DE EMBARAZO AL PRIMER CONTROL *							
1er. trimestre	68.6	75.4	60.1	77.0	54.9	70.3	67.0
2/3 trimestre	25.3	20.8	30.9	18.5	34.8	26.2	25.2
Ningún control	5.8	3.5	8.8	4.1	10.1	3.0	7.8
Nr	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	0.0
TOTAL DE CONTROLES							
0	5.8	3.5	8.8	4.1	10.1	3.0	7.8
1	1.6	1.2	2.3	0.6	3.1	1.5	1.9
2-3	12.5	7.5	18.8	3.8	25.3	11.9	13.9
4	7.5	5.2	10.4	4.0	12.6	8.5	7.0
5 y +	71.3	81.1	59.0	85.1	48.5	74.0	69.0
NS/NR	1.1	1.5	0.7	2.5	0.3	1.1	0.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
NÚMERO DE CASOS	4022	1859	2163	732	1311	947	1032
LUGAR DE CONTROL PRENATAL							
Público	76.3	70.1	84.4	71.8	86.2	86.3	66.0
Privado	18.7	25.5	9.8	26.2	10.3	10.2	24.5
Otro	5.0	4.4	5.8	2.0	3.4	3.5	9.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
NÚMERO DE CASOS	3756	1799	1957	708	1176	920	952

* Excluye 3 casos sin información

CUADRO 25
Porcentaje de nacidos vivos en el período marzo 1999 a febrero 2004 por área de residencia y región,
según lugar de atención del parto y tipo de parto, ENDSSR 2004.

LUGAR DONDE TUVO EL PARTO	TOTAL	ÁREA		REGIÓN			
		URBANA	RURAL	GRAN ASUNCIÓN	NORTE	CENTRO SUR	ESTE
PARTO INSTITUCIONAL	74.1	84.9	60.7	92.0	59.9	78.6	63.0
Establecimiento del MSP y BS	45.1	43.8	46.8	42.9	47.1	58.8	34.0
Sanatorio/Hosp. Privado	11.6	17.3	4.6	19.3	2.8	5.8	15.1
Hospital Consultorio IPS	7.0	9.7	3.6	10.7	4.8	6.9	5.2
Clínica/Médico Privado	4.4	5.8	2.6	2.7	4.4	1.8	7.9
Cruz Roja	2.9	4.2	1.2	9.2	0.4	1.9	0.1
Hospital Materno Infantil (S. Lorenzo)	1.4	2.1	0.5	4.1	0.2	1.1	0.2
Hosp. Militar o Policial	0.8	0.9	0.8	1.9	0.1	0.9	0.3
Hospital de Clínicas/Maternidad Nacional	0.8	0.9	0.6	1.3	0.1	1.4	0.2
PARTO DOMICILIARIO	21.3	11.3	33.8	7.2	35.3	17.6	28.8
En casa con Partera Chae	11.1	4.7	19.2	3.0	21.6	11.6	12.1
En casa de la Partera Chae	4.7	3.4	6.2	2.0	6.1	2.5	8.1
En casa con Partera Profesional	3.1	2.2	4.2	0.9	4.7	0.8	6.0
En casa con Familiares	1.9	0.8	3.3	0.8	2.2	2.5	2.0
Parto Sola	0.5	0.2	0.9	0.4	0.8	0.4	0.5
OTRO	4.6	3.9	5.6	0.8	4.9	3.8	8.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
TIPO DE PARTO *							
Vaginal	73.0	64.0	84.3	59.3	88.0	76.6	72.5
Cesárea	26.9	35.9	15.7	40.7	12.0	23.4	26.4
NÚMERO DE CASOS	4025	1859	2166	732	1313	947	1033

* Excluye 6 casos sin información

CUADRO 26

Porcentaje de nacidos vivos durante el período marzo 1999 a febrero 2004 que fueron llevados al control del recién nacido y distribución porcentual del estado de salud al primer control, según área, región y educación de la madre, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	LE LLEVÓ PARA CONTROL MÉDICO		ESTADO DE SALUD DEL NIÑO				
	%	Nº DE CASOS	Sano	Estaba enfermo	NS/NR	TOTAL*	Nº DE CASOS
TOTAL DEL PAÍS	90.1	2880	89.9	9.8	0.4	100.0	2600
ÁREA							
Urbana	95.3	1421	90.7	9.0	0.3	100.0	1363
Rural	83.8	1459	88.7	10.9	0.4	100.0	1237
REGIÓN							
Gran Asunción	96.2	570	91.5	8.1	0.3	100.0	554
Norte	82.3	878	84.4	15.2	0.4	100.0	741
Centro Sur	93.1	685	92.6	7.1	0.3	100.0	646
Este	86.4	747	88.2	11.3	0.5	100.0	659
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)							
0-2	70.3	188	84.6	15.4	0.0	100.0	131
3-5	80.7	547	86.2	13.5	0.3	100.0	449
6	90.2	869	89.4	10.2	0.4	100.0	782
7-11	95.7	602	89.9	9.4	0.6	100.0	576
12 y +	97.8	674	93.7	6.1	0.2	100.0	662

* Excluye 1 caso sin información

CUADRO 27

Cobertura de inmunización con las cuatro vacunas en conjunto (BCG, Polio, Sarampión y DPT) y cada una por separado, según área de residencia y región: Niños/as de 12 a 23 meses de edad con o sin carné de vacunación, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	Tiene carné	Esquema completo con o sin carné	BCG completa	Polio completa	Sarampión completa	DPT completa	Nº DE CASOS
TOTAL	69.1	65.2	96.1	82.2	75.2	82.8	848
ÁREA							
Urbana	66.1	65.8	98.4	81.9	76.7	83.9	381
Rural	72.7	64.4	93.3	82.6	73.3	81.6	467
REGIÓN							
Gran Asunción	59.7	61.3	97.4	80.1	75.4	76.4	149
Norte	72.4	63.0	92.9	82.0	71.4	79.8	277
Centro Sur	75.1	68.6	97.6	84.1	79.2	88.2	206
Este	69.1	66.0	95.5	82.3	73.2	84.2	216

CUADRO 28

Porcentaje de mujeres de 15 a 44 años de edad que conoce o ha escuchado hablar de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que pueden ser transmitidas por medio de las relaciones sexuales, según características seleccionadas, ENDSRR 2004.

CARACTERÍSTICAS	ITS QUE CONOCE										N° DE CASOS
	VIH/SIDA	Sífilis	Gonorrea	Leucorrea	Candidiasis	Herpes Genital	Condilomas	Tricomoniasis	Chlamydia		
TOTAL	99.4	76.8	73.4	67.0	57.9	46.2	26.6	25.6	15.9		7321
ÁREA											
Urbana	99.8	85.4	78.5	70.5	56.1	56.4	29.8	30.8	18.6		4172
Rural	98.6	60.9	63.9	60.7	61.1	27.2	20.5	16.0	10.9		3149
REGIÓN											
Gran Asunción	99.8	88.8	75.8	66.7	51.3	60.7	27.2	28.6	18.0		1759
Norte	98.5	61.0	68.9	59.9	61.5	30.8	24.6	19.9	13.5		1905
Centro Sur	99.3	75.3	72.1	67.8	60.8	41.3	24.2	22.1	12.9		1747
Este	99.3	72.1	73.7	69.3	60.5	41.7	28.7	27.8	17.3		1910
EDAD											
15-19	98.7	75.3	71.3	55.3	37.9	41.6	19.5	23.1	11.6		1446
20-24	99.7	78.0	75.6	72.8	55.8	51.2	28.3	28.2	18.8		1527
25-29	99.9	76.8	71.3	69.9	61.1	47.4	28.9	27.8	15.6		1308
30-34	99.8	77.3	72.8	69.0	67.1	46.7	28.3	25.4	18.2		1142
35-39	99.4	76.0	74.2	70.9	69.3	45.4	29.9	24.2	16.8		1036
40-44	99.1	78.1	76.0	70.2	75.4	44.8	29.2	25.0	16.2		862
ESTADO CIVIL											
Casada	99.5	74.9	72.5	71.0	65.8	46.7	28.2	24.5	15.8		2667
Unida	99.3	70.1	70.2	65.8	62.3	36.0	25.0	20.3	14.4		1897
Divorciada/separada/viuda	99.6	79.5	73.3	71.6	64.4	46.1	30.2	25.9	17.1		531
Soltera	99.3	81.5	75.9	63.5	47.6	51.3	25.4	29.4	16.6		2226
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)											
0-2	92.7	45.9	57.9	47.7	60.4	14.5	15.6	8.6	10.2		345
3-5	98.6	45.3	57.1	58.1	62.9	16.1	18.4	11.1	10.0		1104
6	99.3	60.7	56.7	59.2	59.9	27.0	19.9	13.0	10.0		1765
7-11	99.9	84.4	75.9	63.6	48.1	46.0	23.4	23.8	12.8		1977
12 y +	100.0	96.7	90.4	81.2	63.2	74.6	38.3	43.4	25.6		2130
SEXUALMENTE EXPUESTA											
Sexualmente activa	99.5	76.0	73.5	70.8	62.8	46.4	28.6	25.4	15.9		5313
No sexualmente activa	99.6	78.5	72.4	67.1	64.1	48.0	28.0	28.9	19.4		822
Sin experiencia sexual	98.7	78.3	73.6	55.2	38.6	44.5	19.4	24.4	14.0		1186

CUADRO 29

Porcentaje de mujeres de 15 a 44 años de edad con conocimiento de VIH/SIDA espontáneo o dirigido y porcentaje que piensa que una persona puede estar infectada por el virus del SIDA y no presentar síntomas (señales) de la enfermedad según características seleccionadas, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	CONOCIMIENTO				NÚMERO DE CASOS
	Espontáneo	Dirigido	Espontáneo y Dirigido	Una persona puede estar infectada del SIDA y no presentar síntomas	
TOTAL	88.0	11.3	99.4	78.7	7321
ÁREA					
Urbana	92.1	7.7	99.8	82.6	4172
Rural	80.6	18.0	98.6	71.5	3149
REGIÓN					
Gran Asunción	91.5	8.3	99.8	82.9	1759
Norte	80.5	18.0	98.5	73.3	1905
Centro Sur	88.3	11.0	99.3	77.4	1747
Este	87.2	12.1	99.3	77.7	1910
EDAD					
15-19	90.1	8.6	98.7	76.4	1446
20-24	91.2	8.5	99.7	83.1	1527
25-29	86.8	13.1	99.9	79.3	1308
30-34	84.6	15.2	99.8	77.0	1142
35-39	87.0	12.3	99.4	77.7	1036
40-44	84.7	14.4	99.1	77.3	862
ESTADO CIVIL					
Casada	87.1	12.4	99.5	78.5	2667
Unida	83.3	16.0	99.3	74.9	1897
Divorciada/separada/viuda	89.1	10.4	99.6	76.3	531
Soltera	91.2	8.1	99.3	81.5	2226
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)					
0-2	61.6	31.1	92.7	63.5	345
3-5	74.6	24.1	98.6	68.5	1104
6	82.4	16.9	99.3	72.6	1765
7-11	94.5	5.5	99.9	77.3	1977
12 y +	94.4	5.6	100.0	89.6	2130
SEXUALMENTE EXPUESTA					
Sexualmente activa	87.4	12.1	99.5	78.2	5313
No sexualmente activa	88.3	11.2	99.6	81.9	822
Sin experiencia sexual	89.8	8.9	98.7	78.5	1186

CUADRO 30
Conocimiento espontáneo de las tres formas de prevención de transmisión sexual del VIH/SIDA,
según características seleccionadas, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	CONOCIMIENTO DE TRES FORMAS DE PREVENCIÓN POR SEPARADO				NÚMERO DE CASOS
	No tener relaciones sexuales	Tener un solo compañero	Usar condones en todas las relaciones sexuales	Conocimiento conjunto de las tres formas de prevención del SIDA	
TOTAL	14.4	13.9	35.7	2.2	7269
ÁREA					
Urbana	17.6	16.9	40.2	2.8	4165
Rural	8.3	8.3	27.3	1.0	3104
REGIÓN					
Gran Asunción	23.7	22.1	48.4	4.5	1756
Norte	7.5	8.1	30.0	0.9	1880
Centro Sur	12.6	11.9	31.3	1.3	1736
Este	9.2	9.7	29.1	1.2	1897
EDAD					
15-19	18.5	9.9	34.7	2.3	1425
20-24	15.8	13.3	37.1	2.5	1521
25-29	13.5	15.8	37.7	2.3	1305
30-34	11.9	16.5	34.4	1.7	1139
35-39	11.5	16.9	35.2	1.9	1027
40-44	10.3	14.6	34.9	2.1	852
ESTADO CIVIL					
Casada	12.0	16.9	36.3	2.2	2652
Unida	6.5	11.4	30.0	1.2	1881
Divorciada/separada/viuda	10.5	12.8	40.3	1.5	529
Soltera	21.3	13.0	37.5	2.9	2207
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)					
0-2	2.8	6.7	22.0	0.1	323
3-5	3.7	6.9	22.6	0.1	1089
6	5.0	7.7	29.4	0.5	1752
7-11	16.1	12.6	37.0	2.1	1975
12 y +	24.3	22.7	45.4	4.4	2130
SEXUALMENTE EXPUESTA					
Sexualmente activa	11.0	15.1	35.5	1.8	5283
No sexualmente activa	15.7	13.7	38.2	3.4	817
Sin experiencia sexual	24.3	10.1	35.2	2.9	1169

CUADRO 31
Distribución porcentual de mujeres de 15 a 44 años de edad, según opinión sobre el riesgo de contraer VIH/SIDA, por características seleccionadas, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	CREE QUE TIENE ALGÚN RIESGO DE INFECTARSE DE SIDA				TOTAL	NÚMERO DE CASOS
	ALGÚN RIESGO/ MODERADO	MUCHO RIESGO/ GRANDE	NINGÚN RIESGO	NO SABE		
TOTAL	20.5	1.8	76.0	1.7	100.0	7269
ÁREA						
Urbana	23.0	1.7	74.1	1.1	100.0	4165
Rural	15.8	1.8	79.5	2.8	100.0	3104
REGIÓN						
Gran Asunción	26.8	2.7	69.4	1.2	100.0	1756
Norte	16.5	2.2	77.7	3.6	100.0	1880
Centro Sur	18.1	1.7	79.0	1.3	100.0	1736
Este	17.9	0.8	79.4	1.9	100.0	1897
EDAD						
15-19	12.6	1.0	84.5	1.9	100.0	1425
20-24	20.3	1.4	77.1	1.2	100.0	1521
25-29	23.1	1.7	73.1	2.0	100.0	1305
30-34	25.1	2.6	70.3	1.9	100.0	1139
35-39	26.9	2.4	69.0	1.8	100.0	1027
40-44	21.4	2.5	74.8	1.4	100.0	852
ESTADO CIVIL						
Casada	23.8	2.1	72.5	1.6	100.0	2652
Unida	22.1	2.3	73.4	2.3	100.0	1881
Divorciada/separada/viuda	25.3	1.7	71.0	2.0	100.0	529
Soltera	16.0	1.2	81.4	1.4	100.0	2207
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)						
0-2	20.1	1.5	72.5	5.9	100.0	323
3-5	17.4	1.8	77.5	3.3	100.0	1089
6	17.4	2.3	78.6	1.7	100.0	1752
7-11	17.4	1.4	79.8	1.4	100.0	1975
12 y +	26.6	1.7	70.8	0.9	100.0	2130
SEXUALMENTE EXPUESTA						
Sexualmente activa	24.6	2.2	71.4	1.8	100.0	5283
No sexualmente activa	16.0	0.9	81.9	1.1	100.0	817
Sin experiencia sexual	10.2	0.8	87.4	1.5	100.0	1169

CUADRO 32

Porcentaje de mujeres de 15 a 44 años de edad actualmente o alguna vez casadas/unidas que han recibido violencia por parte del esposo, compañero o novio, por tipo de violencia, según características seleccionadas, ENDSRR 2004.

CARACTERÍSTICAS	CASOS DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES			NÚMERO DE CASOS
	VIOLENCIA VERBAL	VIOLENCIA FÍSICA	VIOLENCIA SEXUAL	
TOTAL	33.4	19.3	7.6	5077
ÁREA				
Urbana	37.7	21.7	8.4	2701
Rural	26.6	15.5	6.1	2376
REGIÓN				
Gran Asunción	40.2	21.3	8.4	1107
Norte	28.1	16.4	6.0	1404
Centro Sur	28.7	17.1	7.4	1230
Este	33.6	20.6	7.6	1336
EDAD				
15-19	29.4	18.0	9.9	266
20-24	30.7	19.9	5.1	880
25-29	33.2	20.1	6.9	1081
30-34	34.1	20.5	8.8	1066
35-39	33.8	16.8	7.8	975
40-44	36.1	19.6	8.4	809
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)				
0-2	32.1	25.3	7.3	317
3-5	32.5	20.0	9.1	979
6	30.3	17.1	7.2	1459
7-11	36.0	20.1	7.7	1035
12 y +	35.3	19.2	6.8	1287
ESTADO CIVIL				
Casada/unida	29.7	16.5	6.2	4549
Divorciada/separada/viuda	60.2	39.5	17.5	528

CUADRO 33

Porcentaje de mujeres de 15 a 44 años de edad actualmente o alguna vez casadas/unidas, que en los últimos 12 meses ha recibido violencia por parte del esposo, compañero o novio, por tipo de violencia, según características seleccionadas, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	CASOS DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES			NÚMERO DE CASOS
	VIOLENCIA VERBAL	VIOLENCIA FÍSICA	VIOLENCIA SEXUAL	
TOTAL	14.3	6.6	2.6	5077
ÁREA				
Urbana	15.7	7.1	2.4	2701
Rural	12.1	5.8	2.9	2376
REGIÓN				
Gran Asunción	16.8	8.2	2.4	1107
Norte	13.2	6.1	2.7	1404
Centro Sur	12.6	5.8	2.9	1230
Este	14.0	5.9	2.3	1336
EDAD				
15-19	17.1	11.6	4.8	266
20-24	14.3	9.4	2.4	880
25-29	14.0	6.7	1.7	1081
30-34	14.7	6.3	3.1	1066
35-39	14.4	4.5	2.5	975
40-44	13.5	5.0	2.4	809
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)				
0-2	13.7	8.2	3.7	317
3-5	16.2	7.1	4.1	979
6	11.8	5.2	1.9	1459
7-11	16.4	8.5	3.1	1035
12 y +	14.2	5.8	1.6	1287
ESTADO CIVIL				
Casada/unida	13.0	5.6	2.5	4549
Divorciada/separada/viuda	24.0	13.6	2.9	528

CUADRO 34

Distribución porcentual de mujeres de 15 a 44 años de edad actualmente o alguna vez casadas/unidas, víctimas de agresión física o sexual durante los últimos 12 meses, según a quién acudió a pedir ayuda, por características seleccionadas, ENDSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	A QUIÉN ACUDIÓ CUANDO FUE AGREDIDA							TOTAL	NUMERO DE CASOS
	Nadie	Familia de ella	Familia de él	Amigas/vecinas	Comisaría	Juzgado de paz	Otros		
TOTAL	56.8	20.2	2.9	9.1	5.7	2.5	2.8	100.0	365
ÁREA									
Urbana	53.2	22.6	2.8	8.7	6.8	1.6	4.2	100.0	201
Rural	63.0	16.0	3.1	9.7	3.6	4.2	0.3	100.0	164
REGIÓN									
Gran Asunción	52.3	26.6	0.8	6.3	7.0	1.6	5.5	100.0	97
Norte	60.6	26.8	3.1	5.5	2.4	0.0	1.6	100.0	96
Centro Sur	60.0	14.3	4.8	11.4	4.8	4.8	0.0	100.0	87
Este	57.3	15.5	3.6	11.8	6.4	2.7	2.7	100.0	85
EDAD									
15-19	71.9	12.2	2.9	13.0	0.0	0.0	0.0	100.0	31
20-24	44.6	27.0	3.2	11.0	8.9	3.3	2.0	100.0	75
25-29	50.2	22.9	4.4	10.3	7.0	2.6	2.6	100.0	80
30-34	63.7	16.4	3.8	2.7	6.7	2.7	4.0	100.0	74
35-39	64.4	15.9	2.3	5.7	4.8	3.4	3.5	100.0	60
40-44	58.9	20.1	0.0	14.0	1.7	1.7	3.6	100.0	45
ESTADO CIVIL									
Casada/unida	59.9	20.1	3.6	5.7	4.9	2.6	3.2	100.0	299
Divorciada/separada/viuda	46.3	20.6	0.9	20.4	8.2	2.2	1.5	100.0	66
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)									
0-5	51.9	21.2	6.1	12.5	6.4	1.9	0.0	100.0	112
6	59.4	19.0	2.2	9.8	4.6	1.1	3.9	100.0	92
7-11	54.3	21.5	3.0	6.7	5.3	3.9	5.4	100.0	85
12 y +	62.5	18.9	0.0	7.2	6.2	3.0	2.1	100.0	76

CUADRO 35
Porcentaje de mujeres reportando que alguna vez en su vida alguien la obligó a tener relaciones sexuales contra su voluntad, según características seleccionadas, ENDSSR 2004.

CARACTERÍSTICAS	ALGUNA VEZ HA SIDO VIOLADA	NÚMERO DE CASOS
TOTAL	6.5	7301
ÁREA		
Urbana	7.1	4158
Rural	5.5	3143
EDAD		
15-19	3.5	1443
20-24	5.0	1525
25-29	8.2	1303
30-34	9.7	1138
35-39	8.3	1033
40-44	8.1	859
EDUCACIÓN (AÑOS APROBADOS DE ESTUDIO)		
0-2	8.0	344
3-5	9.8	1099
6	7.5	1761
7-11	5.5	1970
12 y +	5.4	2127
ESTADO CIVIL		
Casada/unida	7.4	4549
Divorciada/separada/viuda	21.0	528
Nunca casada	2.5	2224

INDICADORES Y DATOS BÁSICOS DEL PARAGUAY

Indicadores Demográficos, Censo 2002. Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.			
	Total	Urbana	Rural
Población total del país	5163198	2928437	2234761
Población total de mujeres	2559956	1506098	1053858
Población de menores de 5 años	607301	318790	288511
Población de mujeres en edad fértil, 15 a 44 años	1157201	731969	425232
Población de mujeres adultas jóvenes, 15 a 24 años	518094	326598	191496
Población de mujeres adolescentes, 15 a 19 años	284076	171566	112510
Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva, ENDSSR 2004.			
	Total	Urbana	Rural
Tamaño de la muestra			
Viviendas seleccionadas	12236	6834	5402
Viviendas con mujeres elegibles	7519	4286	3233
Entrevistas completas (%)	96.8	96.5	97.0
Población de la muestra			
Mujeres de 15 a 44 años de edad	7321	4172	3149
Mujeres casadas o unidas de 15 a 44 años de edad	4564	2358	2206
Mujeres de 15 a 24 años de edad	2973	1761	1212
Mujeres de 15 a 19 años de edad	1446	824	622
Nacidos/ as vivos/ as de marzo 1999 a febrero 2004	4025	1859	2166
Características de las viviendas (%)			
Servicio de agua por tubería	68.9	84.7	39.7
Baño moderno conectado a red pública/ pozo ciego	67.6	87.1	31.6
Tiene heladera	78.6	88.2	60.8
Tiene electricidad	95.9	99.0	90.1
Hablan guaraní habitualmente en la casa	66.0	54.9	86.6
Fecundidad			
Tasa Global de Fecundidad (TGF) (hijos/ as por mujer)	2.9	2.5	3.7
Nacimientos no deseados (%) (marzo 1999 a febrero 2004)	27.9	29.2	26.3
Conoce cuando es el período fértil de la mujer durante el ciclo menstrual (%)	39.6	43.3	32.7
Mujeres casadas/ unidas de 15 a 44 años de edad (%)	53.7	49.0	62.2
Mujeres con 12 y + años de estudios (%)	32.5	42.5	13.9
Planificación familiar – Mujeres casadas o unidas (%)			
Usa actualmente método anticonceptivo	72.8	76.5	67.4
Método que usa actualmente			
Modernos	60.5	64.2	55.1
Tradicionales	12.3	12.3	12.3
Fuente de obtención del método que usa - Usuaris de métodos modernos			
Sector público (1)	31.7	24.9	46.0
Sector privado (2)	11.6	14.9	4.9
Farmacia	49.7	54.5	39.8
Mujeres que necesitan métodos modernos para evitar embarazos no deseados (%)			
Total	17.9	16.2	21.0
Casadas o unidas	23.1	19.7	28.2
Separada/ divorciada/ viuda	16.0	15.0	18.9
Soltera	11.1	12.5	7.6

(1) Sector público (Incluye Establecimientos del MSP y BS. Sanidad militar o policial, Hospital de Clínicas/ Maternidad Nacional, Hospitales de IPS, Hospital Materno Infantil de San Lorenzo).

(2) Sector privado (Sanatorios/ hospitales privados, Clínicas/ médicos privados).

Salud reproductiva en mujeres de 15 a 24 años de edad (%)	Total	Urbana	Rural
Conoce cuando es el período fértil de la mujer durante el ciclo menstrual	33.1	35.9	27.3
Mujeres con experiencia sexual	57.4	59.1	54.2
Mujeres con experiencia sexual premarital	53.5	57.6	45.3
Mujeres con experiencia sexual < 15 años	8.2	7.6	9.3
Uso de anticonceptivos en 1ª. Relación sexual: premarital	57.6	61.6	47.3
Uso de anticonceptivos en 1ª. Relación sexual: marital	39.5	48.9	36.3
Mujeres alguna vez embarazadas	27.9	25.0	33.7
Actividad sexual reciente (últimos 3 meses) (%)			
Mujeres solteras de 15 a 19 años con experiencia sexual	62.2	63.9	56.4
Mujeres solteras de 20 a 24 años con experiencia sexual	67.4	69.3	60.0
Salud de la mujer (%)			
Con examen de cáncer Papanicolau (PAP)	54.4	55.5	52.5
Ha oído hablar del cáncer de mama	96.3	98.0	93.2
En alguna consulta le han examinado los pechos	27.8	31.6	20.4
Fue enseñada cómo hacerse autoexamen de los senos	44.7	52.8	29.0
Control prenatal, partos y control de recién nacido (%)			
En el primer trimestre	68.6	75.4	60.1
Con 5 o más controles	71.3	81.1	59.0
Partos institucionales	74.1	84.9	60.7
Tasa total de partos por cesárea	26.9	35.9	15.7
Control de recién nacido	90.1	95.3	83.8
Inmunización completa en niños/ as de 12 a 23 meses de edad (%)			
BCG	96.1	98.4	93.3
Polio	82.2	81.9	82.6
DPT/ Pentavalente	82.8	83.9	81.6
Sarampión	75.2	76.7	73.3
Las 4 vacunas en conjunto (BCG, Polio, DPT y Sarampión)	65.2	65.8	64.4
Lactancia Materna			
Niños/ as que nunca fueron amamantados (%)	5.0	4.7	5.6
Duración promedio (meses) de lactancia: niños/as de 0 - 4 años	11.8	10.9	12.9
Niños/ as de 0 - 5 meses con lactancia exclusiva (solo pecho) (%)	21.9	21.5	22.5
Niños/ as de 0 - 5 meses con lactancia predominante (pecho y agua u otros líquidos, excluyendo otros tipos de leche) (%)	27.6	19.2	39.5
Niños/ as de 6 - 9 meses con lactancia complementaria (pecho y sólidos o puré) (%)	59.8	57.0	63.4
VIH/ SIDA–Todas las mujeres 15 - 44 años (%):			
Ha oído hablar de SIDA - Espontáneo	88.0	92.1	80.6
Sabe que personas que no presentan síntomas pueden transmitir el virus de SIDA	78.7	82.6	71.5
Conocimiento espontáneo de 3 formas de prevención primaria de infección (en conjunto)	2.2	2.8	1.0
Conocimiento dirigido de 3 formas de prevención primaria de infección (en conjunto)	78.8	77.5	81.3
Actitudes ante el VIH/SIDA (%)			
Dispuesta a cuidar en su casa a pariente con SIDA	73.7	78.2	65.2
Preferiría mantener en secreto si familiar se infecta con virus de SIDA	38.0	40.0	34.4
Permitiría que profesor/ a infectado/ a con SIDA siga dando clases	53.3	61.7	37.4
Aceptaría que niño/ a infectado/ a con SIDA vaya a la misma escuela que sus hijos	47.7	56.2	31.9
Compraría verduras o alimentos de vendedor con SIDA	37.2	45.3	22.2
Violencia hacia la mujer (%)			
Reporta violencia verbal alguna vez en la vida, de una pareja o ex pareja (*)	33.4	37.7	26.6
Reporta violencia física alguna vez en la vida, de una pareja o ex pareja (*)	19.3	21.7	15.5
Violada con penetración (alguna vez en la vida) (todas las mujeres)	6.5	7.1	5.5

(*) Mujeres alguna vez casadas o unidas.

